



## 養鶏場の一斉消毒（2回目）が 始まります



今月15日から今年度2回目の養鶏場の一斉消毒が始まります。

消石灰を散布して鶏舎まわり・農場敷地境界を消毒しましょう。

- ◆ 鶏舎周囲と農場外縁部に消石灰を散布してください（1m<sup>2</sup>あたり約0.5kg）。  
（散布方法は次頁を参考にしてください）

※散布後は実施報告書の提出をお願いします（2回目提出〆切：令和5年1月10日）。

- ◆ 雨が降った後などには 随時まき直してください。
- ◆ 今回の一斉消毒期間後も 継続して散布するようお願いいたします。

**高病原性鳥インフルエンザ発生予防のため  
「飼養衛生管理基準」の遵守・徹底を！  
（自主点検を実施し、チェック表の提出もお願いします。  
… 毎月7日〆切）**

### 鹿児島県の家きん農場で高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認 （今季国内32例目）

【農場概要】鹿児島県出水市（採卵鶏 約22万羽）

【経緯】12/8 家きんの異状がみられるとの通報

⇒立入⇒簡易検査で陽性

12/9 遺伝子検査でHPAI疑似患畜を確認

過去21日間の平均死亡率の2倍を超える死亡を認める等の異状があれば  
直ちにご連絡ください！

岐阜県中央家畜保健衛生所

電話 058-201-0530


時間外・夜間・休日 090-7024-5269



(参考)

# 消石灰の散布方法

農場敷地



※消毒薬散布量の目安 : 約 0.5 kg/m<sup>2</sup>