

## いもち病の発生に注意しましょう！

6月中旬以降、県内の広域でいもち病の感染好適条件が確認されています。特に7月以降は、飛騨および東濃地域では、感染好適条件が連続して確認されています（表）。7月上～中旬に行った発病調査の結果、飛騨および東濃地域の常発ほ場で発生が認められ、東濃地域の一部ほ場ではずり込み症状も確認されています。ほ場での発病は、感染好適条件が確認された日から5～10日後に認められるようになります。BLASTAM 情報を確認するとともに、ほ場での発生状況に十分注意し、箱施薬を実施していないほ場では発生初期の防除を行ってください。

表 BLASTAMによる葉いもち感染好適条件の出現

地域名 場所 日付	岐阜・西濃地域					中濃地域					東濃地域					飛騨地域								
	岐阜	大垣	愛西 海津	関ヶ 原	揖斐 川	樽見 根尾	美濃	八幡	長滝 白鳥	美濃 加茂	黒川 白川	多治 見	中津 川	恵那	萩原	宮地 下呂	金山	高山	白川 村	六 厩 荘 川	宮之 前朝 日	河合	神岡	栃尾 上宝
6/23	-	-	-	-	-	◎	-	-	◎	-	●	●	◎	◎	●	●	●	-	◎	-	◎	-	-	-
6/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△
6/25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/27	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/29	-	-	▲	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	△	●	-	●
6/30	○	○	-	●	-	●	▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	
7/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	-	-
7/2	-	-	-	●	▲	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	-
7/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	-	●	●	△	-
7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/8	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
7/9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/10	-	-	○	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	●
7/11	-	○	▲	▲	▲	●	▲	-	▲	-	▲	-	▲	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●	●
7/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
7/13	-	▲	▲	▲	-	-	-	-	▲	-	▲	-	▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/14	▲	▲	-	▲	▲	●	▲	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	-	-	●	◎	●	◎	-
7/15	-	○	-	-	-	●	-	◎	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	-	◎	●	●	●	-
7/16	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

凡例 △：準好適条件（湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は20℃未満）  
 ▲：準好適条件（湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は25℃以上）  
 ○：準好適条件（湿潤時間10時間以上だが、湿潤期間の平均気温は15～25℃の範囲外）  
 ◎：準好適条件（湿潤期間が湿潤時間中の平均気温ごとの必要な時間より短い）  
 ●：好適条件（湿潤時間中の平均気温が15℃～25℃であり、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間を満たし、当日を含めてその日以前5日間の日平均気温の平均値が20℃～25℃の範囲にある）  
 -：好適条件、準好適条件は満たされなかった

- ・農薬の使用にあたっては、最新の登録内容を確認し、適正に使用してください。  
農薬登録情報提供システム  
<https://pesticide.maff.go.jp/>
- ・当所のホームページに発生予察情報、病虫害調査データなどを掲載していますのでご活用ください。  
岐阜県病虫害防除所  
<https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/24321/>