

ぎふ感染症かわら版

平成 31 年 2 月 22 日 岐阜県感染症情報センター（岐阜県保健環境研究所）



平成 31 年 3 月 1 日～3 月 7 日は「子ども予防接種週間」です

お子さんの予防接種はお済みですか？

保育所や幼稚園、小学校などでの生活が始まると、
多くの人と身近に接するため、様々な感染症にかかる機会も多くなります。
4 月からの入園・入学に備えて、ワクチンで防ぐことができる感染症は
予防しておくことが大切です。



この機会にもう一度、**母子健康手帳**で**お子さんの予防接種の記録を確認し**、
受け忘れがある場合は、**早めに接種**を受けましょう。

特に**麻しん・風しん第 2 期**の予防接種（年長児のお子さんが対象）は、
定期接種の期間が**3 月 31 日まで**ですので、
まだ接種を受けていない方は、**確実に接種を終え**ましょう。



小学校入学までに受けることができる主な予防接種

定期接種 … 予防接種法に基づいて行われる予防接種です。
定められた期間内であれば、ほとんどの市町村で無料（公費）で受けることができます。
市町村の案内にしたがい、決められた年齢で決められた回数を接種しましょう。

ヒブ（Hib）

★2 か月～5 歳未満

小児用肺炎球菌

★2 か月～5 歳未満

B 型肝炎

★1 歳未満

水痘（みずぼうそう）

★1 歳～3 歳未満

BCG

（結核）

★1 歳未満

四種混合

（DPT-IPV：ジフテリア・
百日咳・破傷風・ポリオ）

★第 1 期：3 か月～7 歳 6 か月未満
（★DT 第 2 期：11 歳～13 歳未満）

MR（麻しん風しん混合）

★第 1 期：1 歳～2 歳未満
★第 2 期：小学校就学前 1 年間（年長児）

日本脳炎

★第 1 期：6 か月～7 歳 6 か月未満
（★第 2 期：9 歳～13 歳未満）

任意接種

… 定期接種以外の予防接種です。
保護者の希望で、かかりつけ医と相談して
接種することができます。
基本的に有料（自己負担）ですが、
費用の助成を行っている市町村もあります。

ロタウイルス

◆生後 6～32 週（24 週）
第 1 回は、遅くとも
生後 14 週 6 日までに接種

おたふくかぜ

◆1 歳以上

★印は定期接種の年齢です。接種回数と接種の間隔はワクチンの種類により異なります。

現在、国内で麻しんと風しんの患者が増えています！ 2回の定期接種を確実に受けましょう！




麻しん

麻しんウイルスによる感染症で、人から人にうつります。
主な症状は発熱や咳・鼻水、発しんなどですが、
肺炎や脳炎など重い合併症を起こすことがあり、
死亡する割合は1,000人に1人とされています。

感染力が非常に強く、空気感染もするので、
たった一人の麻しん患者から、
何十人もの人に感染を広げてしまう
ことも珍しくありません。

今年に入り、三重県や大阪府を中心に
国内の麻しん患者が急増しており、
県内でも1月に5人の麻しん患者が確認されています。

手洗いやマスクのみでの予防は難しく、**ワクチン接種が最も効果的な予防法**です。



麻しん患者の発生状況(2019年1~6週(12/31~2/10))

※データは国立感染症研究所HPより

風しん

風しんウイルスによる感染症です。
咳などのしぶきによる飛沫感染で人から人にうつります。
主な症状は発熱、発しん、リンパ節の腫れなどで、
まれに脳炎などを起こすこともあります。

また、**妊婦さんが妊娠初期に感染すると、眼や心臓、耳などに障害をもつ子が生まれることがあります(先天性風しん症候群)**、特に注意が必要です。

2018年夏ごろから国内で風しん患者が増えており、
2019年2月現在も流行が続いています。

過去に予防接種を受ける機会がなかった成人男性で感染する人が多くなっています。



麻しん・風しんともに、一人でも多くのお子さんが
2回の定期接種を確実に受けることが、個人の感染を予防するとともに、
今後の国内流行を防ぐことにつながります。



保育所や幼稚園、高齢者施設など、希望される施設に対して「ぎふ感染症かわら版」のメール配信もおこなっています。
くわしくは岐阜県感染症情報センターホームページをご覧ください。

岐阜県感染症情報センター

