

关于被红火蚁所刺时的注意事项（致普通人员）

症状

- 【轻度】 被刺的瞬间感觉灼热般的剧烈疼痛。经过一段时间后被刺的地方变痒。之后会化脓。
- 【中度】 以被刺部分为中心红肿不断扩散，部分或全身可能产生伴随瘙痒的疹子（荨麻疹）。
- 【重度】 可能产生呼吸困难、声音沙哑、剧烈心悸、眩晕等症状，症状发展下去可能意识失明。产生这些症状时，重度过敏反应“过敏性休克”出现的可能性很高，不及时处理会产生生命危险。

处理方法：对红火蚁毒性的反应因人有很大的差异。

【刚被刺后】

静置20~30分钟左右，注意身体状况是否有所变化。

【身体状况突变的情况】

根据体质不同可能产生重症。若身体状况突变请联系救护车等，立即前往医疗机构就诊。就诊时请告知“自己被蚂蚁刺了”“可能有过敏性休克反应”，要求立刻诊治。

※特别需要注意的人员

红火蚁的毒含有和蜜蜂毒性共通的成分，即使以前未被红火蚁刺过，但对蜜蜂毒性有过敏反应的人请特别注意。

关于红火蚁的详细信息请浏览环境省主页。

<http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/fireant.html>※仅限日语