

## 暑い季節がやってきます。 事前にハエ対策をしましょう!!

ブーンと不快なハエの音、ヒトや牛をイライラさせるばかりか、有害な病原体(サルモネラ等)を媒介し、近隣からの苦情などいいことはありません。ハエ対策を取って快適な畜産経営をしましょう。

### 対策① ハエの発生源を無くす

- ハエの発生源(ウジが発生するところ)を無くすのが最大の対策です。
- 発生源は、水気があってウジの食べ物があるところです。
- 糞尿が溜まる場所、飼槽の食べ残し、通路などのゴミ、畜舎の隅、水分調整不十分の堆肥舎など、いろいろなところに発生源があります。
- できれば毎日、少なくとも1週間に一度(ウジが成虫になる前)は、除糞や清掃を行いましょ。
- 風通しを良くして乾燥させる、飼料箱にはフタをするなども良い方法です。

### 対策② 幼虫(ウジ)を無くす

- 発生源への昆虫発育抑制剤(IGR系)の散布は効果が高く、基本対策です。
- 使用する薬剤の用法を守り、定期的(1ヶ月に一度)に散布しましょ。

### 対策③ 成虫を飛ばせない

- 発生源を無くし、ウジ対策をやった上で、成虫対策を行うことが効果的です。
- 成虫対策には毒餌法が効果があります。ハエを引きつける砂糖、酢、ミルクなどに昆虫発育抑制剤を混ぜて、皿やボトルに入れる方法や壁や、柱に直接吹き付ける方法があります。
- 薬剤の吹きつけには、ハエが休息する夕方や雨の日が効果が高く、特に天井に止まる習性があるので天井への散布が有効です。

【注意!!】畜産物に殺虫薬剤を残留させないため、畜体への直接噴霧を認められていない薬品を使用する際には、家畜に暴露させないこと、休薬期間(使用禁止期間)を守ること等、定められた用法・用量を守って使いましょ。また、使用の際には記録を残しましょ。

中央家畜保健衛生所  
〒501-1112 岐阜市柳戸1-1  
TEL : 058-201-0530  
FAX : 058-201-0531

