

# 家畜衛生情報

## サシバエ・アブ対策をして 牛白血病を予防しましょう!!

サシバエとアブは牛を吸血し、乳量を減少させ、牛白血病を媒介します。  
放置することは経営上、よくありません。  
サシバエとアブを良く知り、対策を取りましょう。

	サシバエ	アブ
発生時期	春先や秋口の涼しい時期	6月～9月(真夏の昼間)
吸血	雄雌ともに刺して吸血	雌のみ皮膚を切り裂き吸血
発生源	糞便、堆肥(湿ったところ)	湿地、草地、森林等
卵の期間	1～2日	1～2週間
幼虫の期間	10～26日(3回脱皮)	1～3年にわたり脱皮
さなぎの期間	2～3日	1～2週間
成虫の寿命	10～30日程度	1ヶ月程度

### サシバエ

#### ①発生対策

サシバエは糞尿、湿ったところに卵を産みます。



給水器



堆肥舎の隅



畜舎周辺

清掃、草刈り等を心掛けましょう。

#### ②幼虫対策

幼虫は昆虫成長抑制剤への抵抗性が低く、効果的です。  
毎月2回ほど、発生源に対し繰り返し散布しましょう。

#### ③成虫対策

ハエ取り紙や防虫ネットを活用し、侵入防止に努めましょう。

# アブ

アブは他の害虫に比べて駆虫剤も効きにくく、防除は困難ですが、安定した家畜の生産性確保のため、防除が重要です。

対策として防虫ネットを張って侵入防止に努めたり、畜舎周辺の草刈りを行います。

黒い物に集まるアブの習性を利用したアブトラップなどもあります。

## アブトラップは市販品もありますが、自作も出来ます。

### 自作品のアブトラップ

主な材料

シート(骨を抜いた傘など)

ペットボトル


黒い物(ボールや風船)



内部には黒い物を入れます。

### アブトラップの構造としくみ

一度入ると  
出られません。



内部の黒いボールにアブ  
が集まります

ご不明な点については、中央家畜保健所までお問い合わせください。

中央家畜保健衛生所  
〒501-1112 岐阜市柳戸1-1  
TEL : 058-201-0530  
FAX : 058-201-0531

