

## ニワトリヌカカ対策をしましょう！

全国でロイコトゾーン症が散発しています。ヌカカ対策を実施し感染を防ぎましょう。

### ロイコトゾーン症 (届出伝染病)

原虫の感染による。ニワトリヌカカが媒介  
5～7月に発生。特に開放鶏舎。

感染12-13日 急死(喀血腹腔内出血)

感染14日- 貧血、緑色便

それ以降 発育遅延、産卵低下、衰弱死



### ヌカカ対策

鶏舎周囲1kmに水田がある場合注意必要。

夜間鶏舎に侵入し吸血。

- ・ 防虫網、鶏舎壁面への殺虫剤塗布
- ・ 捕虫器などの設置
- ・ 送風

3m/秒 (団扇で強く仰ぐ程度) でヌカカは飛べない。

- ・ 蚊取り線香など (夜間だけでも)

電気蚊取り器 1個/30m<sup>2</sup>程度を目安に設置。

死亡鶏の増加があれば家畜保健衛生所まで  
ご連絡をお願いします。

### 中央家畜保健衛生所

岐阜市柳戸1-1 TEL:(058)201-0530 FAX:(058)201-0531

E-mail:c24502@pref.gifu.lg.jp

休日及び平日の時間外(17:30～翌日8:30)の緊急連絡は

TEL:090-7024-5269まで

