


令和元年5月28日
岐阜県病害虫防除所

カキノヘタムシガの適期防除を行いましょう

発生量	少ない
初発日から5月27日までの樹あたり 累積発生量	
本年：2.6頭（平年：12.7頭）	

岐阜市木田の見取り調査では、本虫の初発生は5月12日と平年並でした。本年の発生量は少なく、発蛾最盛期は判然としませんが、例年、カキの開花最盛期と発蛾最盛期が重なることから、本年のカキ開花最盛期の5月20日前後が本虫の発蛾最盛期であったと考えられます。

防除適期は発蛾最盛期から7～14日後の6月上旬と予測されます。なお、ほ場によって開花盛期が異なるため、よくほ場を確認して防除を行ってください。また、例年発生が多いほ場では長期残効のある薬剤か、1回目散布から7～10日後に追加防除を実施してください。



- ・農薬の使用にあたっては、最新の登録内容を確認し、適正に使用してください。
農林水産消費安全技術センター
http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm
- ・当所のホームページに発生予察情報、病害虫調査データなどを掲載していますのでご活用ください。
岐阜県病害虫防除所
<http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/nogyo/gifu-clean/24321/>