病害虫情報第 11 号

平成 30 年 10 月 10 日
岐阜県病害虫防除所

コナジラミ類(ﾀﾊﾞｺｺﾅｼﾞﾗﾐ)の施設内への侵入に注意！

岐阜・西濃地域において、トマト施設内に設置した黄色粘着板へのコナジラミ類誘殺数が平年より多く推移しています（図１）。

現在、施設外のコナジラミ類誘殺数は平年より少ないものの（図２）、今後、気温の低下とともにコナジラミ類は施設内へ侵入すると考えられます。

９月の台風による施設破損の有無を確認する等、コナジラミ類の侵入に注意するとともにトマトでは黄化葉巻病の発生に注意してください。



図１　ﾄﾏﾄ施設内のｺﾅｼﾞﾗﾐ類誘殺数の推移（海津市）



図２　施設外のｺﾅｼﾞﾗﾐ類誘殺数の推移（海津市日原）

※平年値：H23 から７年間の平均

・農薬の使用にあたっては、最新の登録内容を確認し、適正に使用してください。
農林水産消費安全技術センター
http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm
・当所のホームページに発生予察情報、病害虫調査データなどを掲載していますのでご活用ください。
岐阜県病害虫防除所
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/nogyo/gifu-clean/24321/