病害虫情報第７号

平成３０年７月２４日
岐阜県病害虫防除所

カキノヘタムシガに注意

発生時期 （発蛾最盛期）	やや早い （平年比４日早）
発蛾最盛期樹あたり発生量 **本年：１．４頭（平年：５．０頭）** **発蛾最盛期** **本年：7 月 16 日（平年：7 月 20 日）**	

見取り調査の結果は、図１のとおりで、７月１６日(1.4 頭)にピークが認められました。平年のピークは７月２０日（5.0 頭）で、発生時期はやや早く、発生数は少ないと考えられますが、防除時期に注意してください。

発蛾最盛期 3～10 日後頃より果実への食入が始まるため、防除適期は７月下旬頃と予測されます。なお、例年発生が多いほ場では１回目散布から７～10 日後に追加防除を実施してください。



図１　カキノヘタムシガ成虫見取り調査結果（調査地点：岐阜市木田）

・農薬の使用にあたっては、最新の登録内容を確認し、適正に使用してください。
農林水産消費安全技術センター
http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm

・当所のホームページに発生予察情報、病害虫調査データなどを掲載していますのでご活用ください。
岐阜県病害虫防除所
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/nogyo/gifu-clean/24321/