病害虫情報第６号

平成 30 年 7 月 11 日
岐阜県病害虫防除所

果樹カメムシ類の飛来に注意！！

県下全域で、予察灯・フェロモントラップへのチャバネアオカメムシ、クサギカメムシの誘殺数が 6 月第 5 半旬から急激に増加しています（図 1，2）。

現在発生している越冬世代成虫は、7 月下旬頃まで発生が続くと予想されます。今後、夜温が高い日にはカメムシの動きが活発になるため、果樹園への飛来状況に十分注意し、飛来を確認した場合は、直ちに防除を実施してください。



※中津川市駒場については H29 から設置開始のため、平年値なし

※すべてチャバネアオカメムシの誘殺数

図１　各地域の予察灯誘殺数



※高山市国府町のみクサギカメムシ、その他はチャバネアオカメムシの誘殺数

図 2　各地域のフェロモントラップ誘殺数

なお、今年は 5 月 31 日に病害虫発生予察注意報第 1 号「果樹：果樹カメムシ類」を発表しています。あわせて参考にしてください。

・病害虫発生予察注意報第 1 号「果樹：果樹カメムシ類」
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/nogyo/gifu-clean/24321/index_12127.data/20180531_NO1chuuihou_kajukamemushi.pdf

・農薬の使用にあたっては、最新の登録内容を確認し、適正に使用してください。
農林水産消費安全技術センター
http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm
・当所のホームページに発生予察情報、病害虫調査データなどを掲載していますのでご活用ください。
岐阜県病害虫防除所
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/nogyo/gifu-clean/24321/