病害虫情報第４号

平成３０年５月２４日
岐阜県病害虫防除所

カキノヘタムシガに注意

発 生 時 期 （発蛾最盛期）	やや早い （平年比３日早）
発蛾最盛期樹あたり発生量 **本年：２．４頭（平年：２．１頭）** **発蛾最盛期** **本年：5 月 19 日（平年：5 月 22 日）**	

岐阜市木田の調査地点では、見取り調査の結果、越冬世代成虫は５月２日と早くから観察され、発蛾最盛期は５月１９日（平年５月２２日）とやや早くなっています。なお、発生量は樹あたり 2.4 頭（平年 2.1 頭）と平年並となっています（図１）。

発蛾最盛期 10 日後頃より果実への食入が始まるため、防除適期は５月下旬～６月上旬と予測されます。なお、例年発生が多いほ場では１回目散布から７～10 日後に追加防除を実施してください。



※ 平年(5 日平均)は、過去 10 年間の各年の発蛾最盛期前後２日間を含む５日間の平均値を示すため、発蛾最盛期あたりの発生量より小さい値となります。

図１　カキノヘタムシガ成虫見取り調査結果（調査地点：岐阜市木田）

・農薬の使用にあたっては、最新の登録内容を確認し、適正に使用してください。
農林水産消費安全技術センター
http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm

・当所のホームページに発生予察情報、病害虫調査データなどを掲載していますのでご活用ください。
岐阜県病害虫防除所
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/nogyo/gifu-clean/24321/