

	岐阜	大垣	愛知	関原	揖斐川	樽見	美濃	八幡	長瀧	濃白鳥	黒川	多治見	中津川	恵那	萩原	宮下呂	金山	高山	白川村	六厩莊川	河合	神岡	柄尾上宝
日付																							
9/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9/6	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●	◎	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
9/7	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	△	—	△
9/8	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—
9/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9/10	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

凡例 △ : 準好適条件（湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は20°C未満）

▲ : 準好適条件（湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は25°C以上）

○ : 準好適条件（湿潤時間10時間以上だが、湿潤期間の平均気温は15~25°Cの範囲外）

◎ : 準好適条件（湿潤期間が湿潤時間中の平均気温ごとの必要な時間より短い）

● : 好適条件（湿潤時間中の平均気温が15°C~25°Cであり、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間を満たし、当日を含めてその日以前5日間の日平均気温の平均値が20°C~25°Cの範囲にある）

— : 好適条件、準好適条件は満たされなかった

空白 : 欠測値があるため判定不能

\*感染好適条件が現れると感染し、潜伏期間（5~10日）を経て発病します。