

2017年7月BLASTAMによるいもち病の発病条件

病害虫防除所

日付	岐阜	大垣	愛西 海津	関ヶ 原	揖斐 川	樽見 根尾	美濃	八幡	長滝 白鳥	美濃 加茂	黒川 白川	多治 見	中津 川	恵那	萩原	宮地 下呂	金山	高山	白川 村	六所 庄川	宮之 前朝日	河合	神岡	栃尾 上宝
7/1	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	◎	—	—	◎	—	—	△	—	—	—
7/2	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	—	—	—
7/3	○	○	○	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	◎	—
7/4	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
7/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/11	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎
7/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/13	○	—	○	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—
7/14	—	—	—	—	—	●	—	▲	●	—	●	—	▲	—	—	▲	▲	—	—	◎	—	—	—	—
7/15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	▲	—	▲	—	—	—	—	●	—	—	—	●
7/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	—	—	—
7/18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	●	—	—	—
7/19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—
7/21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▲	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—
7/22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/23	—	—	—	—	—	▲	—	—	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	▲	●	—	—	●	—	●
7/24	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	—	▲	▲	—	—	▲	—	▲	—	—	●	—	—	—
7/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	▲	▲	—	—	—	▲	—	—	—	—	—	—
7/26	—	—	—	○	○	●	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▲	—	—	—	—	—	—	—
7/27	—	—	—	—	○	—	▲	▲	—	—	—	○	—	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
7/28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▲	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
7/29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
7/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▲	▲	—	—	▲	—	—	—	—	—	—	—
7/31	○	—	—	—	—	—	▲	—	—	—	—	—	—	▲	—	—	▲	—	—	—	—	—	—	—

- 凡例 △ : 準好適条件 (湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は20℃未満)
▲ : 準好適条件 (湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は25℃以上)
○ : 準好適条件 (湿潤時間10時間以上だが、湿潤期間の平均気温は15～25℃の範囲外)
◎ : 準好適条件 (湿潤期間が湿潤時間中の平均気温ごとの必要な時間より短い)
● : 好適条件 (湿潤時間中の平均気温が15℃～25℃ であり、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間を満たし、当日を含めてその日以前5日間の日平均気温の平均値が20℃～25℃の範囲にある)
— : 好適条件、準好適条件は満たされなかった
空白 : 欠測値があるため判定不能
*感染好適条件が現れると感染し、潜伏期間 (5～10日) を経て発病します。