

2017年5月BLASTAMによるいもち病の発病条件

病虫害防除所

日付	岐阜	大垣	愛西 海津	関ヶ 原	揖斐 川	樽見 根尾	美濃	八幡	長滝 白鳥	美濃 加茂	黒川 白川	多治 見	中津 川	恵那	萩原	宮地 下呂	金山	高山	白川 村	六所 庄川	宮之 前朝日	河合	神岡	栃尾 上宝
5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
5/7	◎	—	—	—	—	—	—	○	○	◎	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	—	○	○	○
5/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/10	◎	—	◎	—	—	—	○	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—
5/11	◎	—	◎	◎	◎	○	○	—	—	◎	—	—	—	—	○	—	◎	○	○	○	—	○	○	○
5/12	—	△	—	◎	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	○	○	○	○
5/13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	◎	—	○	—	○	—	○	—	—	—	○	○	○
5/14	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	◎	—	○	○	—	—	—	—	○	—	—	○
5/15	—	—	—	—	◎	—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
5/18	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—
5/19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/25	—	—	◎	●	●	◎	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	○	◎	○	○	◎	◎	○
5/26	◎	—	—	—	—	◎	—	◎	—	—	—	◎	—	—	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—
5/27	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—
5/28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- 凡例 △ : 準好適条件 (湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は20℃未満)
▲ : 準好適条件 (湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は25℃以上)
○ : 準好適条件 (湿潤時間10時間以上だが、湿潤期間の平均気温は15～25℃の範囲外)
◎ : 準好適条件 (湿潤期間が湿潤時間中の平均気温ごとの必要な時間より短い)
● : 好適条件 (湿潤時間中の平均気温が15℃～25℃ であり、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間を満たし、当日を含めてその日以前5日間の日平均気温の平均値が20℃～25℃の範囲にある)
— : 好適条件、準好適条件は満たされなかった
空白 : 欠測値があるため判定不能
*感染好適条件が現れると感染し、潜伏期間 (5～10日) を経て発病します。