

家畜衛生情報



(H19.1.30)

鶏舎の防疫対策は大丈夫ですか？再確認を！

～ 宮崎県に続き岡山県で高病原性鳥インフルエンザが発生 ～

国内では宮崎県と岡山県で相次いで高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されています。あなたの鶏舎は「野生動物の鶏舎への侵入防止」、「農場出入口での消毒」等「飼養衛生管理基準(別添)」が守られていますか？今一度再点検をお願いします。

【岡山県の発生概要】

- ・場 所 (裏面地図)
高梁市 採卵鶏農場 約12,000羽
- ・経 過
H19. 1. 26 1棟で2羽の死亡を確認
- 1. 27 朝、同鶏舎で15羽の死亡を確認、高梁家畜保健衛生所へ連絡
当該農場へ立入・採材、岡山家畜保健衛生所へ材料を送付
 - ・岡山家保が簡易検査を実施、7羽中7羽が陽性の反応
 - ・当該農場の飼養鶏の隔離を指示及び周辺農場に対する移動自粛の要請
 - ・同鶏舎でさらに5羽が死亡(累計22羽)
- 1. 28 家畜保健衛生所においてウイルスを分離、動物衛生研究所(茨城県)へ搬送
 - ・同鶏舎でさらに17羽が死亡(累計39羽)
 - ・周辺農場に立ち入り調査を実施、異常がないことを確認
- 1. 29 高病原性鳥インフルエンザと決定(H5亜型のA型インフルエンザウイルスを確認)
 - ・飼養鶏の殺処分命令、周辺半径10Kmを移動制限区域に指定
 - ・同鶏舎でさらに24羽が死亡(累計63羽)



飛騨家畜保健衛生所の当面の対応

- 短期間に本病が続発している状況から本病を養鶏農場内に侵入させないよう「飼養衛生管理基準10項目」の遵守の徹底・再点検と異常鶏の発生の有無について調査を行います。
- 万が一に備え愛玩鳥の飼養に対しても本病侵入防止のための協力を求めていく予定です。

鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人へ感染することは世界的にも報告されていません。

飛騨家畜保健衛生所

TEL(0577)33-1111 FAX 32-9019 E-mail:c24508@pref.gifu.lg.jp

異常など確認された場合には、至急ご連絡ください。

岡山県における高病原性鳥インフルエンザの発生場所



高梁市
通報:H19.1.27