

中国で高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)の新たな発生を確認！

* 台湾など近隣の国々では継続して発生しています。

(次ページの中国・台湾の発生状況の地図をご参照ください。)

【概要】

- ・新たな発生: 1件
- ・発生日 : 2012年4月18日
- ・確定日 : 2012年4月24日
- ・血清型 : H5N1

【発生状況】

- ・発生場所: 遼寧省 大連市 中山区
- ・家きん : 282羽(5羽死亡、277羽淘汰)

【感染源】

- ・不明(調査中)


【対応】

- ・隔離・淘汰・ワクチンは接種しない 等

大型連休にともない人や物の動きが活発になるとウイルスの伝播の可能性が高まります。侵入防止対策の徹底をお願いします！

飼養衛生管理基準を遵守し、病気の侵入防止の徹底を！

- ・ 飼養家きんの健康観察、異常の早期発見、早期通報
- ・ 野生動物などの鶏舎への侵入防止
- ・ 農場、鶏舎の出入口での消毒の徹底
- ・ 関係者以外の農場への立入制限
- ・ 発生国への渡航の自粛
- ・ 入退場する人や車両についての記録と消毒の徹底




異状に気づいたら、すみやかに 家畜保健衛生所に御連絡ください。

飛騨家畜保健衛生所

TEL(0577)33 - 1111 FAX32 - 9019

E - mail:c24508@pref.gifu.lg.jp


中国における高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)の発生状況(2007年1月～)



※更新点:遼寧省における高病原性H5N1の発生(感染確認日:2012年4月24日)

※出典:OIE他

台湾における鳥インフルエンザの発生状況(2011年～)



高病原性	【場所】	【発生日】	【血清型】	【動物種(詳細)】	
2011年	① 嘉義県溪口郷	3月2日	H5N2(低)	家きん	
	② 嘉義県溪口郷	3月28日	H7N3(低)	家きん	
	③ 嘉義県大林鎮	5月20日	H7N3(低)	家きん	
	④ 新竹県竹北市	11月10日	H5N2(低)	家きん	
●	⑤ 彰化県芳苑郷	11月25日	H5N2(低・高)	家きん(産卵鶏)	
2012年	●	⑥ 台南市六甲郷	2月7日	H5N2(高)	家きん(ブロイラー)
		⑦ 南投県名間郷	2月21日	H5N2(低)	家きん(ブロイラー)
	●	⑧ 彰化県芳苑郷	2月22日	H5N2(高)	家きん
	●	⑨ 彰化県竹塘郷	3月5日	H5N2(高)	家きん(産卵鶏)
		⑩ 新北市三重区	3月6日	H5N2(低)	家きん
	●	⑪ 屏東県塩埔郷	3月15日	H5N2(高)	家きん
		⑫ 宜蘭県員山郷	3月13日	H5N2(低)	家きん(あひる)
		⑬ 宜蘭県員山郷	3月14日	H5N2(低)	家きん(ブロイラー)

※出典:OIEほか

日付は発生日(各々の事例が始めて観察された日)

()内の“高”は、高病原性鳥インフルエンザ、“低”は、低病原性鳥インフルエンザを表す。