

## 山県市の養豚場で豚コレラ！！ (県内で12施設目)

【飼養状況】 2,034頭（親豚：1,099頭、子豚：935頭）

【発生の経緯】

3月22日（金）・飼養者から中央家保に連絡あり

（母豚22頭の食欲が落ちている。）

・中央家保が農場へ立入検査を実施、農家へは移動自粛要請  
（食欲不振豚、同居豚を採血、検温（35.7～41.4℃））

3月23日（土）・遺伝子検査陽性、疑似患畜決定、殺処分等 防疫措置開始  
移動制限区域（1農場）、搬出制限区域（7農場）で制限実施

### 豚コレラの特定症状について

以下に示すいずれかの異常豚が確認された場合は、  
直ちに家畜保健衛生所へ通報してください。

異常が個体あるいは群として観察されるかどうかが重要ポイントです。  
異常豚・死亡豚が確認された場合は、周辺の豚の状況（体温測定等）を  
一層注意深く観察していただきますよう、重ねてお願いをいたします。

- 1 耳翼、下腹部または四肢などに紫斑がある。
- 2 同一の豚房内（同一の畜舎内）で、一週間程度複数の豚に以下の症状が拡大して認められる。
  - （1）40℃以上の発熱、元気消失、食欲減退
  - （2）便秘・下痢
  - （3）結膜炎（目やに）
  - （4）歩行困難、後躯麻痺、けいれん
  - （5）削瘦、被毛粗剛、発育不良（ひね豚）
  - （6）流死産などの異常産の発生
  - （7）血液凝固不全の皮下出血、皮膚紅斑、天然孔からの出血、血便
- 3 同一の畜舎内で、一週間程度複数の繁殖豚または肥育豚が突然死亡する。
- 4 血液検査で、同一の豚房内（同一の畜舎内）で複数の豚に白血球数の減少（1万個未満/μl）などが確認される。

※平日時間外（午前8時30分～午後5時15分以外）や休日の電話に対しては、「電話交換業務が終了しています。」に続く、  
「お急ぎの場合は、そのまま「1番」をダイヤル願います。」の案内メッセージに従って対応をお願いします。


飛騨家畜保健衛生所（飛騨総合庁舎内）

〒506-8688 高山市上岡本町7-468

E-mail : c24508@pref.gifu.lg.jp

**TEL : 0577-33-1111（内線405）**

FAX : 0577-32-9019



## 〈車両消毒ポイントの設置場所及び消毒方法〉

番号	消毒ポイント名	住所	消毒方法	消毒対象	運営時間
1	山県市役所	山県市高木1000-1	噴霧	畜産関係車両	24時間
2	伊自良総合運動公園	山県市洞田127-67	噴霧	畜産関係車両	24時間
3	JAぎふアグリパーク鈴ヶ坂	岐阜市石谷寺ノ前65-1	噴霧	畜産関係車両	24時間
4	JAぎふ春近育苗センター	岐阜市溝口童子111	噴霧	畜産関係車両	24時間