

令和2年7月31日
岐阜県病害虫防除所

カキノヘタムシガに注意

発生時期 (発蛾最盛期)	やや遅い (平年比4日遅)
発蛾最盛期樹あたり発生量 本年：2.2頭（平年：4.5頭） 発蛾最盛期 本年：7月24日（平年：7月20日）	

見取り調査の結果は、図1のとおりで、本年は7月24日(2.2頭)にピークが認められ、平年と比べ4日遅れとなりました（平年は7月20日）。ピーク時の発生量は平年より少なかったのですが、防除適期が短いため防除タイミングに注意してください。

発蛾最盛期 3～10 日後頃より果実への食入が始まるため、防除適期は8月上旬頃と予測されます。なお、例年発生が多いほ場では1回目散布から7～10 日後に追加防除を実施してください。




図1 カキノヘタムシガ成虫見取り調査結果（調査地点：岐阜市木田）

- ・農薬の使用にあたっては、最新の登録内容を確認し、適正に使用してください。
農林水産消費安全技術センター
http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm
- ・当所のホームページに発生予察情報、病害虫調査データなどを掲載していますのでご活用ください。
岐阜県病害虫防除所
<http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/nogyo/gifu-clean/24321/>