

# 宮崎県（国内18、19例目）

## 高病原性鳥インフルエンザ（H5亜型）が発生！

高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました。

18例目 農場所在地：宮崎県 都城市  
(12月7日) 飼養状況：肉用鶏（約6万羽）

19例目 農場所在地：宮崎県 小林市  
(12月8日) 飼養状況：肉用鶏（約4.3万羽）

★岐阜県告示による消石灰の散布期日は、11月25日～12月9日です。

**必ず消石灰を散布してください。**

★近隣県でも発生しており、鳥インフルエンザ発生リスクが高いと考えられます。



防鳥ネット  
の確認



消石灰の  
こまめな散布



適切な濃度の  
消毒液の使用  
こまめな交換

いつもと様子が違う時は、ただちに通報をお願いします

- ・1日の死亡率が、過去21日平均の2倍以上
- ・5羽以上の鶏が、まとまってうずくまっている、死んでいる
- ・鶏冠、肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低下等の症状

異常があれば、直ちに家畜保健衛生所へ連絡をお願いします  
高病原性鳥インフルエンザ相談窓口（中央家畜保健衛生所）

電話番号：058-201-0530

時間外・夜間・休日：090-7024-5269

