

令和3年8月6日
岐阜県病害虫防除所

コナジラミ類(ハコナジラミ)の発生に注意！

岐阜・西濃地域において、トマト施設外に設置した黄色粘着板へのコナジラミ類累積誘殺数（5／Ⅰ～7／Ⅵ半旬累計）が1,907頭と平年の約3倍に多くなっています（図）。

例年、7月下旬以降増加傾向にあるので、施設内への侵入防止のため、防虫ネットの展開、施設周辺の除草や黄色粘着テープの設置、定植時の粒剤の施用など対策を強化して下さい。また、トマトやキュウリの定植作業時にコナジラミ類がハウス内に侵入しないよう注意して下さい。




図 施設外の黄色粘着板におけるコナジラミ類誘殺数の推移(海津市日原)

※タバココナジラミは、トマト黄化葉巻病やキュウリ退緑黄化病の病原ウイルスを媒介するため、特に注意が必要です。

- ・農薬の使用にあたっては、最新の登録内容を確認し、適正に使用してください。
農薬登録情報提供システム (<https://pesticide.maff.go.jp/>)
- ・当所のホームページに発生予察情報、病害虫調査データなどを掲載していますので
ご活用下さい。 岐阜県病害虫防除所 (<https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/24321/>)