

オミクロン株 拡大阻止!!

令和4年3月3日 岐阜県

オミクロン株の特徴

普通の風邪よりも症状が強く
何日か通勤等が不可能に。

極めて強い
感染力

感染力の強さが
デルタ株の3倍程度

早く発病

感染から発病までの
潜伏期間は2~3日

ワクチン接種済でも
感染の可能性

ワクチン2回接種から半年経過すると、
発症予防効果は10%程度まで低下
(英国の報告)

欠勤者の増加により、社会経済活動に大きな影響を及ぼす可能性があります。

しかし、オミクロン株の感染も

基本的な感染防止対策(マスク着用、手指衛生、密回避、体調不良時の行動ストップなど)
により防ぐことができます。

ワクチン追加接種の積極的なご検討をお願いします

追加接種の主な効果は、

「新型コロナウイルス感染への抵抗力(抗体価)の増加」です。

どちらのワクチンで3回目の接種をしても抗体価は大幅上昇するため、

ワクチンの種類よりも、できるだけ早く接種することが重要です!

3回目接種後について		ファイザー製	モデルナ製
抗体価(接種から28日後)		54.1倍	67.9倍
副反応 発生割合	38℃以上の発熱	21.4%	49.2%
	全身倦怠感	69.1%	78.0%
	頭痛	55.0%	69.6%

※副反応は接種1日後の発現が最も高く、3日後にはほぼ消失します (厚労省公表データより)

春の行事にご注意ください

春は歓送迎会、お花見、卒業、入学、異動などにより普段会わない方と集まる機会が増える時期です。

混雑した場所への外出や大人数・長時間の飲食を伴う行事など、感染リスクの高い行動は極力回避してください。