

いもち病の発生に注意しましょう！

BLASTAMIによる葉いもちの感染好適条件となる日が頻繁に出現しています。7月10日、11日は広域的に好適条件となり、特に飛騨南部では連続して出現しています（表）。

7月上～中旬に行った発病調査の結果、県下全域で葉いもちの発生を確認しました。また、恵那農林事務所および下呂農林事務所からは、一部の地域でズリコミ症状発生の情報提供がありました。発生を確認していない地域でも、雨や朝露が乾きにくいほ場では発生している可能性があります。

週間天気予報では、今後1週間は晴れの日が少ない予報となっており、今後は発生していない地域でも、発病する可能性が高くなっています。

葉いもちの発生は、穂いもちの発生につながるため、早期発見・早期防除が重要です。

BLASTAMIによる葉いもち感染好適条件

地域名		岐阜・西濃地域					中濃地域				東濃地域			飛騨地域											
地点		岐阜	大垣	愛西 海津	関ヶ 原	揖斐 川	樽見 根尾	美濃	八幡	長滝 白鳥	美濃 加茂	黒川 白川	多治 見	中津 川	恵那	萩原	宮地下 呂	金山	高山	白川 村	六所 荘川	宮ヶ前 朝日	河合	神岡	板尾 上室
月	日																								
6	19	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	△	-	-	-	-
	23	●	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	◎	-	-	●	-	-	-	-
	24	-	○	-	-	●	-	●	●	-	▲	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	▲	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●
	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	○	-	▲	-	-	▲	▲	-	-	▲	-	▲	-	▲	-	-	▲	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	▲	-	-	-	-	-	-	●	-	▲	▲	▲	-	◎	▲	▲	●	-	●	-	-
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-	●	▲	-	●	-	●	-	●
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	-
	11	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●
	12	-	-	-	-	-	-	●	-	-	○	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	▲	-	-	-	▲	-	◎	-	●	-	▲	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●
	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-

△：準好適条件（湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は20℃未満）
 ▲：準好適条件（湿潤時間10時間以上だが、前5日間の平均気温は25℃以上）
 ○：準好適条件（湿潤時間10時間以上だが、湿潤期間の平均気温は15～25℃の範囲外）
 ◎：準好適条件（湿潤期間が湿潤時間中の平均気温ごとの必要な時間より短い）
 ●：好適条件（湿潤時間中の平均気温が15℃～25℃であり、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間を満たし当日を含めてその日以前5日間の日平均気温の平均値が20℃～25℃の範囲にある）
 -：好適条件、準好適条件は満たされなかった
 空白：欠測値があるため判定不能
 ＊感染好適条件が現れると感染し、潜伏期間（5～10日）を経て発病します。



葉いもち症状



葉いもちズリコミ症状
（下呂農林事務所より提供）

- 農薬の使用にあたっては、最新の登録内容を確認し、適正に使用してください。
農薬登録情報提供システム
<https://pesticide.maff.go.jp/>
- 当所のホームページに発生予察情報、病害虫調査データなどを掲載していますのでご活用ください。
岐阜県病害虫防除所
<https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/24321/>