

令和 6 年 1 0 月 2 8 日

岐阜県病虫害防除所

ハスモンヨトウなどチョウ目害虫の発生に注意！

(対象作物：露地・施設野菜、花き類)

美濃地域の野菜ほ場に設置したハスモンヨトウフェロモントラップにおける誘殺数は、8 月以降非常に多く、9 月第Ⅳ半旬～1 0 月第Ⅲ半旬の累計誘殺数は、岐阜市で 3,003 頭（平年 2085.2 頭）、海津市で 3,431 頭（平年 628.9 頭）、可児市で 1,381 頭（平年 1104.2 頭）、恵那市で 2,794 頭（平年 293.8 頭）と引き続き非常に多く、海津市では 1 0 月第Ⅳ半旬の誘殺数が 1,846 頭と急激に増加しています（図）。

キャベツやほうれんそうなど秋冬野菜では、ハスモンヨトウによる食害が認められています。向こう 1 カ月の気象予報（名古屋地方気象台 10 月 24 日発表）では、気温は高く、今後も本虫の増殖に好適な条件が続くと見込まれ、被害の拡大が懸念されますので、ほ場内をよく確認し、発生が多い場合は若齢幼虫のうちに薬剤防除を実施してください。

なお、イチゴなど施設栽培では、野外の気温が低下する 11 月以降も発生が継続します。ハウスサイドや天窓など開口部は防虫ネットで被覆し成虫の飛び込み防止に努めてください。また、卵塊は植物体だけでなく防虫ネット等にも産み付けられます。見つけた卵塊は除去し、幼虫は見つけ次第捕殺してください（写真）。




図 各地域に設置したハスモンヨトウフェロモントラップにおける誘殺数の推移



写真 防虫ネットに産卵されたハスモンヨトウの卵塊（左）と幼虫によるイチゴ葉の食害（右）

- ・ 農薬の使用にあたっては、最新の登録内容を確認し、適正に使用してください。
農薬登録情報提供システム <https://pesticide.maff.go.jp/>
- ・ 当所のホームページに発生予察情報、病害虫調査データなどを掲載していますので
ご活用ください。
岐阜県病害虫防除所 <https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/24321/>