

家畜衛生情報

ハエの防除対策をしましょう！

気温が上昇し、ハエの発生が始まる時期となりました。
早めの対策を行い、効率的な防除に努めましょう。

発生源

80%

卵



産卵数
50~150個




半日~1日

幼虫



4~6日

サナギ



4~7日

成虫



20%

目に見える成虫は
氷山の一角！

- ・数回産卵
- ・新鮮便に産卵

卵・幼虫（発生源）対策

根本からの発生
防除が有効です！

(1)清潔な状態の維持

ハエの産卵場所になる糞尿が蓄積しやすい
畜舎の隅や汚水だまり、残餌などの清掃

(2)適切な堆肥処理

堆肥の定期的かつ確実な切り返し
(高温(40℃以上)、乾燥(50%以下)で分解率が激減)

(3)殺虫剤の散布(IGR剤)

IGR剤(昆虫成長制御剤(脱皮阻害剤))を1ヶ月間隔で散布

成虫対策

(1)防虫ネットや粘着シートの設置

地上から2m覆い、穴等がないか確認

(2)殺虫剤の散布(成虫用)

ハエの休憩場所となる壁や柱等に定期的に散布
殺虫剤は2, 3種類をローテーションして使用

(3)畜舎周囲の草刈り

ハエの休憩場の除去

※薬剤は、用法・用量を守って使用してください。

畜体にかかると休薬期間が必要になることがあるため、ご注意ください。

岐阜県中央家畜保健衛生所

〒501-1112 岐阜市柳戸1-1

TEL : 058-201-0530

FAX : 058-201-0531

Email : c24502@pref.gifu.lg.jp

