


徳島県鳴門市の野鳥から 低病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N3亜型) が検出されました！！

10月28日徳島県鳴門市において採取された野鳥糞便1検体から、低病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N3亜型)が検出されました



池は小さいが、カモ類の渡りの中継地になっておりたくさんの野鳥が訪れます



高病原性鳥インフルエンザウイルス 感染リスクの高い野鳥

リスク種 1 (最も感染リスクが高い)

<カモ目カモ科>

マガモ シジュウカラガン コブハクチョウ コハクチョウ
オオハクチョウ オシドリ キンクロハジロ ヒシクイ

<タカ目タカ科>

オジロワシ オオワシ チュウヒ ハイタカ サシバ
ノスリ クマタカ オオタカ

<ハヤブサ目ハヤブサ科>

チョウゲンボウ ハヤブサ

低病原性鳥インフルエンザ

対策はウイルスの鶏舎への
侵入防止に努めることです

<症状>

* 無症状の場合もあります

- ・ 最もよくみられるのは、咳、くしゃみ、喘鳴、流涙など呼吸器症状
- ・ 産卵低下や被毛粗剛、沈鬱、元気衰退、食欲減退、下痢などもみられる。

これらの症状を認めた場合は
すぐに家畜保健衛生所へ連絡

★伝播力が強いものの、ほとんど臨床症状を示さず、発見が遅れるおそれがある
(海外では、高病原性鳥インフルエンザに変異した事例も確認されている)

飼養衛生管理基準を再確認・徹底 をお願いいたします



車両

…ウイルスが車両に付いてきているかも

- ・トラックの荷台は洗浄してから消毒していますか？
- ・運転席マット等、土が付着する場所は洗浄・消毒していますか？
- ・農場に出入りする際は消毒していますか？
- ・乗車前、降車後に手指の洗浄・消毒をしていますか？



簡易消毒機



消毒用動力噴霧器




農場の入口

…ウイルスが農場入口まできているかも

- ・消毒前の水洗で、長靴(靴底)の汚れを落としていますか？
- ・消毒液は汚れていませんか？
- ・消毒液の濃度は十分ですか？
- ・手指の洗浄・消毒はしていますか？
- ・手を拭くときのタオルを使い回していませんか？


防鳥ネットを設置しましょう



水洗槽

消毒槽

鶏舎、農場敷地周縁に2~3m幅で
消石灰を散布しましょう



2~3m

消石灰の効果

1. 高病原性鳥インフルエンザに対する消毒効果
2. ネズミなどの野生動物に忌避効果あり



鶏舎

…ウイルスが農場に入っているかも

- ・専用の衣服・長靴を着用していますか？
- ・給水、給餌施設の野生動物対策は大丈夫ですか？

新鮮な水道水を使用しましょう



異状がありましたら直ちに家畜保健衛生所へご連絡ください。

中央家畜保健衛生所 (西濃総合庁舎内)

〒503-0838 大垣市江崎町422-3

TEL: 0584-73-1111 (内線314) FAX: 0584-73-4422

E-mail: c24502@pref.gifu.lg.jp

