

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所     | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 17964 | 大垣市上石津町地内   | R8.3.29 | 捕獲 | 雄  | 約 87 cm  | R8.4.3  | 陰性   |
| 17965 | 大垣市上石津町地内   | R8.4.1  | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.4.3  | 陽性   |
| 17966 | 美濃加茂市蜂屋町地内  | R8.3.30 | 捕獲 | 雄  | 約 97 cm  | R8.4.3  | 陰性   |
| 17967 | 各務原市各務地内    | R8.4.1  | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.4.3  | 陰性   |
| 17968 | 可児市久々利地内    | R8.4.2  | 捕獲 | 雌  | 約 150 cm | R8.4.7  | 陰性   |
| 17969 | 可児市大森地内     | R8.4.2  | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.4.7  | 陰性   |
| 17970 | 高山市越後町地内    | R8.4.4  | 捕獲 | 雌  | 約 92 cm  | R8.4.7  | 陰性   |
| 17971 | 郡上市高鷲町地内    | R8.4.5  | 捕獲 | 雄  | 約 92 cm  | R8.4.7  | 陰性   |
| 17972 | 美濃加茂市下米田町地内 | R8.4.4  | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.4.7  | 陰性   |
| 17973 | 可児市大森地内     | R8.4.4  | 捕獲 | 雌  | 約 113 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17974 | 可児市西帷子地内    | R8.4.5  | 捕獲 | 雄  | 約 125 cm | R8.4.7  | 陰性   |
| 17975 | 各務原市鷺沼地内    | R8.4.2  | 捕獲 | 雌  | 約 70 cm  | R8.4.7  | 陰性   |
| 17976 | 郡上市明宝地内     | R8.4.3  | 捕獲 | 雌  | 約 91 cm  | R8.4.7  | 陰性   |
| 17977 | 郡上市明宝地内     | R8.4.3  | 捕獲 | 雌  | 約 50 cm  | R8.4.7  | 陰性   |
| 17978 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.6  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17979 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.6  | 捕獲 | 雌  | 約 79 cm  | R8.4.10 | 陰性   |
| 17980 | 郡上市高鷲町地内    | R8.4.6  | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.4.10 | 陰性   |
| 17981 | 郡上市高鷲町地内    | R8.4.6  | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.4.10 | 陰性   |
| 17982 | 中津川市落合地内    | R8.4.6  | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17983 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.6  | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17984 | 揖斐川町乙原地内    | R8.4.6  | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.4.10 | 陰性   |
| 17985 | 郡上市高鷲町地内    | R8.4.8  | 捕獲 | 雄  | 約 150 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17986 | 高山市越後町地内    | R8.4.8  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17987 | 郡上市高鷲町地内    | R8.4.7  | 捕獲 | 雌  | 約 130 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17988 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.7  | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17989 | 美濃加茂市下米田町地内 | R8.4.8  | 捕獲 | 雄  | 約 150 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17990 | 白川町切井地内     | R8.4.6  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17991 | 郡上市大和町地内    | R8.4.4  | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17992 | 可児市西帷子地内    | R8.4.7  | 捕獲 | 雄  | 約 119 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17993 | 郡上市美並町地内    | R8.4.8  | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17994 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.8  | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.4.14 | 陰性   |
| 17995 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.8  | 捕獲 | 雌  | 約 79 cm  | R8.4.14 | 陰性   |
| 17996 | 可児市大森地内     | R8.4.9  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.4.14 | 陰性   |
| 17997 | 可児市長洞地内     | R8.4.9  | 捕獲 | 雌  | 約 102 cm | R8.4.14 | 陰性   |
| 17998 | 高山市朝日町地内    | R8.4.11 | 捕獲 | 雄  | 約 94 cm  | R8.4.14 | 陰性   |
| 17999 | 美濃加茂市牧野地内   | R8.4.10 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.4.14 | 陰性   |
| 18000 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.12 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.4.17 | 陰性   |
| 18001 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.12 | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.4.17 | 陰性   |
| 18002 | 各務原市鷺沼地内    | R8.4.13 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.4.17 | 陰性   |
| 18003 | 八百津町上飯田地内   | R8.4.13 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.4.17 | 陰性   |
| 18004 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.4.11 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.4.17 | 陰性   |
| 18005 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.4.11 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.4.17 | 陰性   |
| 18006 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.4.13 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.4.17 | 陰性   |
| 18007 | 可児市久々利地内    | R8.4.13 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.4.17 | 陰性   |
| 18008 | 白川町切井地内     | R8.4.12 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.4.17 | 陰性   |
| 18009 | 下呂市金山町地内    | R8.4.14 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.4.17 | 陰性   |
| 18010 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.13 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.4.17 | 陰性   |
| 18011 | 郡上市大和町地内    | R8.4.9  | 捕獲 | 雄  | 約 99 cm  | R8.4.17 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所   | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-----------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18012 | 郡上市大和町地内  | R8.4.12 | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.4.17 | 陰性   |
| 18013 | 各務原市鷺沼地内  | R8.4.14 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.4.17 | 陰性   |
| 18014 | 下呂市萩原町地内  | R8.4.14 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.4.20 | 陰性   |
| 18015 | 下呂市萩原町地内  | R8.4.15 | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.4.20 | 陰性   |
| 18016 | 美濃加茂市牧野地内 | R8.4.16 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.4.20 | 陰性   |
| 18017 | 可児市西帷子地内  | R8.4.16 | 捕獲 | 雌  | 約 93 cm  | R8.4.20 | 陰性   |
| 18018 | 土岐市泉町地内   | R8.4.16 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.4.20 | 陰性   |
| 18019 | 飛騨市古川町地内  | R8.4.16 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.4.20 | 陰性   |
| 18020 | 郡上市高鷲町地内  | R8.4.16 | 捕獲 | 雌  | 約 118 cm | R8.4.23 | 陽性   |
| 18021 | 可児市久々利地内  | R8.4.17 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18022 | 八百津町野上地内  | R8.4.17 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18023 | 飛騨市古川町地内  | R8.4.17 | 捕獲 | 雌  | 約 94 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18024 | 飛騨市古川町地内  | R8.4.17 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18025 | 八百津町野上地内  | R8.4.18 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18026 | 本巣市根尾樽見地内 | R8.4.19 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18027 | 郡上市八幡町地内  | R8.4.19 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18028 | 郡上市大和町地内  | R8.4.19 | 捕獲 | 雄  | 約 99 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18029 | 郡上市高鷲町地内  | R8.4.20 | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18030 | 土岐市白川町地内  | R8.4.18 | 捕獲 | 雌  | 約 105 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18031 | 高山市越後町地内  | R8.4.20 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18032 | 瑞浪市釜戸町地内  | R8.4.18 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18033 | 大垣市上石津町地内 | R8.4.20 | 捕獲 | 雄  | 約 109 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18034 | 中津川市蛭川地内  | R8.4.20 | 捕獲 | 雄  | 約 91 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18035 | 恵那市串原地内   | R8.4.20 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18036 | 中津川市蛭川地内  | R8.4.20 | 捕獲 | 雄  | 約 101 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18037 | 恵那市明智町地内  | R8.4.20 | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18038 | 山県市谷合地内   | R8.4.20 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.4.28 | 陽性   |
| 18039 | 土岐市泉町地内   | R8.4.20 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.4.28 | 陰性   |
| 18040 | 土岐市泉町地内   | R8.4.21 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.4.28 | 陰性   |
| 18041 | 本巣市文殊地内   | R8.4.21 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.4.28 | 陰性   |
| 18042 | 中津川市落合地内  | R8.4.22 | 捕獲 | 雌  | 約 105 cm | R8.4.28 | 陰性   |
| 18043 | 八百津町久田見地内 | R8.4.23 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.4.28 | 陰性   |
| 18044 | 瑞浪市日吉町地内  | R8.4.23 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.4.28 | 陰性   |
| 18045 | 中津川市蛭川地内  | R8.4.23 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.4.28 | 陰性   |
| 18046 | 中津川市蛭川地内  | R8.4.23 | 捕獲 | 雄  | 約 90 cm  | R8.4.28 | 陰性   |
| 18047 | 高山市越後町地内  | R8.4.24 | 捕獲 | 雌  | 約 123 cm | R8.5.1  | 陰性   |
| 18048 | 八百津町久田見地内 | R8.4.24 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.4.28 | 陰性   |
| 18049 | 大垣市青墓町地内  | R8.4.24 | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.4.28 | 陰性   |
| 18050 | 可児市久々利地内  | R8.4.24 | 捕獲 | 雌  | 約 97 cm  | R8.4.28 | 陰性   |
| 18051 | 中津川市蛭川地内  | R8.4.24 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.4.28 | 陰性   |
| 18052 | 関市下有知地内   | R8.4.25 | 捕獲 | 雄  | 約 38 cm  | R8.5.1  | 陰性   |
| 18053 | 郡上市八幡町地内  | R8.4.25 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.5.1  | 陰性   |
| 18054 | 海津市南濃町地内  | R8.4.27 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.5.1  | 陽性   |
| 18055 | 郡上市高鷲町地内  | R8.4.26 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.5.1  | 陰性   |
| 18056 | 八百津町上飯田地内 | R8.4.28 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.1  | 陰性   |
| 18057 | 中津川市落合地内  | R8.4.29 | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.5.1  | 陰性   |
| 18058 | 各務原市鷺沼地内  | R8.4.30 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.5.8  | 陰性   |
| 18059 | 郡上市高鷲町地内  | R8.4.29 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.5.8  | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所   | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-----------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18060 | 恵那市明智町地内  | R8.5.6  | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.5.8  | 陰性   |
| 18061 | 飛騨市古川町地内  | R8.5.1  | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.5.8  | 陰性   |
| 18062 | 可児市久々利地内  | R8.5.2  | 捕獲 | 雄  | 約 68 cm  | R8.5.8  | 陰性   |
| 18063 | 可児市久々利地内  | R8.5.4  | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.5.8  | 陰性   |
| 18064 | 可児市西帷子地内  | R8.5.3  | 捕獲 | 雌  | 約 98 cm  | R8.5.8  | 陰性   |
| 18065 | 郡上市高鷲町地内  | R8.5.2  | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.5.12 | 陰性   |
| 18066 | 白川町切井地内   | R8.5.3  | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.12 | 陰性   |
| 18067 | 可児市久々利地内  | R8.5.7  | 捕獲 | 雄  | 約 114 cm | R8.5.12 | 陰性   |
| 18068 | 飛騨市古川町地内  | R8.5.6  | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.5.12 | 陰性   |
| 18069 | 大垣市上石津町地内 | R8.5.8  | 捕獲 | 雄  | 約 118 cm | R8.5.12 | 陰性   |
| 18070 | 可児市久々利地内  | R8.5.8  | 捕獲 | 雄  | 約 148 cm | R8.5.12 | 陰性   |
| 18071 | 恵那市山岡町地内  | R8.5.9  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.5.12 | 陰性   |
| 18072 | 本巣市根尾能郷地内 | R8.5.8  | 捕獲 | 雌  | 約 91 cm  | R8.5.12 | 陰性   |
| 18073 | 可児市久々利地内  | R8.5.8  | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.5.12 | 陰性   |
| 18074 | 関市下之保地内   | R8.5.8  | 捕獲 | 雄  | 約 112 cm | R8.5.12 | 陰性   |
| 18075 | 恵那市山岡町地内  | R8.5.9  | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18076 | 高山市久々野町地内 | R8.5.11 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18077 | 瑞浪市釜戸町地内  | R8.5.8  | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18078 | 瑞浪市釜戸町地内  | R8.5.9  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18079 | 郡上市八幡町地内  | R8.5.10 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18080 | 可児市西帷子地内  | R8.5.11 | 捕獲 | 雌  | 約 135 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18081 | 坂祝町黒岩地内   | R8.5.11 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18082 | 飛騨市古川町地内  | R8.5.11 | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.5.14 | 陽性   |
| 18083 | 中津川市蛭川地内  | R8.5.11 | 捕獲 | 雌  | 約 86 cm  | R8.5.14 | 陰性   |
| 18084 | 中津川市蛭川地内  | R8.5.11 | 捕獲 | 雌  | 約 130 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18085 | 恵那市山岡町地内  | R8.5.9  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18086 | 郡上市八幡町地内  | R8.5.12 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.15 | 陰性   |
| 18087 | 八百津町野上地内  | R8.5.12 | 捕獲 | 雄  | 約 92 cm  | R8.5.15 | 陰性   |
| 18088 | 関市迫間地内    | R8.5.12 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.5.15 | 陰性   |
| 18089 | 郡上市高鷲町地内  | R8.5.12 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.5.15 | 陰性   |
| 18090 | 郡上市高鷲町地内  | R8.5.13 | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.5.15 | 陰性   |
| 18091 | 高山市大洞町地内  | R8.5.12 | 捕獲 | 雌  | 約 93 cm  | R8.5.15 | 陰性   |
| 18092 | 可児市久々利地内  | R8.5.13 | 捕獲 | 雄  | 約 125 cm | R8.5.15 | 陰性   |
| 18093 | 可児市西帷子地内  | R8.5.13 | 捕獲 | 雄  | 約 108 cm | R8.5.15 | 陰性   |
| 18094 | 大垣市青墓町地内  | R8.5.13 | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.5.15 | 陰性   |
| 18095 | 揖斐川町檜原地内  | R8.5.11 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.5.15 | 陰性   |
| 18096 | 中津川市加子母地内 | R8.5.13 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.5.15 | 陰性   |
| 18097 | 本巣市根尾能郷地内 | R8.5.13 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.5.19 | 陰性   |
| 18098 | 本巣市根尾能郷地内 | R8.5.13 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.19 | 陰性   |
| 18099 | 高山市久々野町地内 | R8.5.13 | 捕獲 | 雌  | 約 92 cm  | R8.5.19 | 陰性   |
| 18100 | 中津川市蛭川地内  | R8.5.14 | 捕獲 | 雌  | 約 98 cm  | R8.5.19 | 陽性   |
| 18101 | 恵那市笠置町地内  | R8.5.14 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.19 | 陰性   |
| 18102 | 可児市大森地内   | R8.5.14 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.19 | 陰性   |
| 18103 | 関市下有知地内   | R8.5.14 | 捕獲 | 雄  | 約 43 cm  | R8.5.19 | 陰性   |
| 18104 | 郡上市八幡町地内  | R8.5.14 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.5.19 | 陰性   |
| 18105 | 恵那市串原地内   | R8.5.14 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.19 | 陰性   |
| 18106 | 関市下有知地内   | R8.5.14 | 捕獲 | 雌  | 約 36 cm  | R8.5.19 | 陰性   |
| 18107 | 恵那市上矢作町地内 | R8.5.16 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.5.21 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所     | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18108 | 恵那市山岡町地内    | R8.5.18 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.21 | 陰性   |
| 18109 | 関市志津野地内     | R8.5.16 | 捕獲 | 雌  | 約 98 cm  | R8.5.21 | 陰性   |
| 18110 | 中津川市蛭川地内    | R8.5.16 | 捕獲 | 雄  | 約 91 cm  | R8.5.21 | 陰性   |
| 18111 | 関市倉知地内      | R8.5.18 | 捕獲 | 雌  | 約 91 cm  | R8.5.21 | 陰性   |
| 18112 | 可児市久々利地内    | R8.5.18 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.21 | 陰性   |
| 18113 | 可児市久々利地内    | R8.5.18 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.21 | 陰性   |
| 18114 | 下呂市金山町地内    | R8.5.18 | 捕獲 | 雄  | 約 84 cm  | R8.5.21 | 陰性   |
| 18115 | 高山市朝日町地内    | R8.5.20 | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.5.22 | 陰性   |
| 18116 | 関市神野地内      | R8.5.19 | 捕獲 | 雌  | 約 128 cm | R8.5.22 | 陰性   |
| 18117 | 可児市今地内      | R8.5.20 | 捕獲 | 雄  | 約 102 cm | R8.5.22 | 陰性   |
| 18118 | 郡上市高鷲町地内    | R8.5.19 | 捕獲 | 雄  | 約 90 cm  | R8.5.22 | 陰性   |
| 18119 | 本巣市法林寺地内    | R8.5.20 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.5.22 | 陰性   |
| 18120 | 恵那市山岡町地内    | R8.5.20 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.26 | 陰性   |
| 18121 | 恵那市明智町地内    | R8.5.22 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.26 | 陰性   |
| 18122 | 郡上市高鷲町地内    | R8.5.22 | 捕獲 | 雌  | 約 150 cm | R8.5.26 | 陰性   |
| 18123 | 高山市朝日町地内    | R8.5.25 | 捕獲 | 雄  | 約 150 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18124 | 恵那市上矢作町地内   | R8.5.22 | 捕獲 | 雌  | 約 150 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18125 | 恵那市明智町地内    | R8.5.25 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18126 | 可児市久々利地内    | R8.5.25 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18127 | 白川町赤河地内     | R8.5.24 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18128 | 白川町赤河地内     | R8.5.24 | 捕獲 | 雌  | 約 40 cm  | R8.5.28 | 陰性   |
| 18129 | 美濃加茂市山之上町地内 | R8.5.24 | 捕獲 | 雄  | 約 113 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18130 | 美濃加茂市山之上町地内 | R8.5.24 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18131 | 岐阜市長良志段見地内  | R8.5.23 | 捕獲 | 雌  | 約 105 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18132 | 岐阜市長良志段見地内  | R8.5.22 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.28 | 陰性   |
| 18133 | 岐阜市岩井地内     | R8.5.21 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18134 | 恵那市明智町地内    | R8.5.25 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18135 | 郡上市高鷲町地内    | R8.5.23 | 捕獲 | 雌  | 約 150 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18136 | 美濃加茂市牧野地内   | R8.5.25 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18137 | 八百津町野上地内    | R8.5.26 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.5.29 | 陰性   |
| 18138 | 揖斐川町小津地内    | R8.5.22 | 捕獲 | 雌  | 約 72 cm  | R8.5.29 | 陰性   |
| 18139 | 揖斐川町東津汲地内   | R8.5.23 | 捕獲 | 雌  | 約 98 cm  | R8.5.29 | 陰性   |
| 18140 | 岐阜市岩井地内     | R8.5.26 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.5.29 | 陰性   |
| 18141 | 本巣市外山地内     | R8.5.26 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.5.29 | 陰性   |
| 18142 | 八百津町錦織地内    | R8.5.26 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.5.29 | 陰性   |
| 18143 | 八百津町錦織地内    | R8.5.26 | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.5.29 | 陰性   |
| 18144 | 恵那市山岡町地内    | R8.5.27 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.29 | 陰性   |
| 18145 | 可児市久々利地内    | R8.5.27 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.5.29 | 陰性   |
| 18146 | 岐阜市岩井地内     | R8.5.25 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.5.29 | 陰性   |
| 18147 | 可児市大森地内     | R8.5.28 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18148 | 美濃加茂市蜂屋町地内  | R8.5.28 | 捕獲 | 雌  | 約 98 cm  | R8.6.2  | 陰性   |
| 18149 | 恵那市山岡町地内    | R8.5.28 | 捕獲 | 雄  | 約 103 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18150 | 可児市皐ヶ丘地内    | R8.5.28 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18151 | 郡上市八幡町地内    | R8.5.28 | 捕獲 | 雌  | 約 70 cm  | R8.6.2  | 陰性   |
| 18152 | 恵那市明智町地内    | R8.5.28 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.6.2  | 陰性   |
| 18153 | 恵那市明智町地内    | R8.5.28 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18154 | 恵那市山岡町地内    | R8.5.28 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18155 | 中津川市中津川地内   | R8.5.29 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.6.2  | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所    | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18156 | 恵那市明智町地内   | R8.5.28 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18157 | 恵那市明智町地内   | R8.5.31 | 捕獲 | 雄  | 約 98 cm  | R8.6.2  | 陰性   |
| 18158 | 恵那市山岡町地内   | R8.5.31 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18159 | 恵那市明智町地内   | R8.5.31 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18160 | 岐阜市打越地内    | R8.5.30 | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18161 | 岐阜市山県岩地内   | R8.5.28 | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18162 | 八百津町久田見地内  | R8.5.30 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18163 | 本巣市神海地内    | R8.6.1  | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18164 | 土岐市土岐津町地内  | R8.6.1  | 捕獲 | 雌  | 約 70 cm  | R8.6.4  | 陰性   |
| 18165 | 郡上市高鷲町地内   | R8.5.30 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18166 | 郡上市高鷲町地内   | R8.5.30 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18167 | 飛騨市古川町地内   | R8.5.30 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18168 | 中津川市手賀野地内  | R8.5.31 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.4  | 陰性   |
| 18169 | 中津川市手賀野地内  | R8.5.31 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18170 | 岐阜市岩井地内    | R8.5.31 | 捕獲 | 雌  | 約 103 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18171 | 関市下之保地内    | R8.6.1  | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18172 | 関市下之保地内    | R8.6.1  | 捕獲 | 雄  | 約 127 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18173 | 本巣市外山地内    | R8.6.2  | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.6.5  | 陰性   |
| 18174 | 本巣市日当地内    | R8.6.2  | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.6.5  | 陰性   |
| 18175 | 八百津町野上地内   | R8.6.2  | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.6.5  | 陰性   |
| 18176 | 白川村小白川地内   | R8.6.3  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.6.5  | 陰性   |
| 18177 | 郡上市八幡町地内   | R8.6.1  | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.6.5  | 陰性   |
| 18178 | 恵那市山岡町地内   | R8.6.3  | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.6.5  | 陰性   |
| 18179 | 恵那市明智町地内   | R8.6.3  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.5  | 陰性   |
| 18180 | 中津川市上野地内   | R8.6.3  | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.6.5  | 陰性   |
| 18181 | 関市下有知地内    | R8.6.3  | 捕獲 | 雄  | 約 42 cm  | R8.6.5  | 陰性   |
| 18182 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.6.3  | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.9  | 陰性   |
| 18183 | 瑞浪市日吉町地内   | R8.6.4  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.6.9  | 陰性   |
| 18184 | 関市迫間地内     | R8.6.5  | 捕獲 | 不明 | 約 105 cm | R8.6.9  | 陰性   |
| 18185 | 土岐市泉町地内    | R8.6.5  | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.6.9  | 陰性   |
| 18186 | 恵那市明智町地内   | R8.6.5  | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.9  | 陰性   |
| 18187 | 恵那市明智町地内   | R8.6.5  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.9  | 陰性   |
| 18188 | 川辺町下川辺地内   | R8.6.5  | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.6.9  | 陰性   |
| 18189 | 川辺町鹿塩地内    | R8.6.5  | 捕獲 | 雌  | 約 93 cm  | R8.6.9  | 陰性   |
| 18190 | 八百津町和知地内   | R8.6.6  | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.6.11 | 陰性   |
| 18191 | 郡上市高鷲町地内   | R8.6.5  | 捕獲 | 雌  | 約 140 cm | R8.6.11 | 陰性   |
| 18192 | 中津川市蛭川地内   | R8.6.5  | 捕獲 | 雄  | 約 103 cm | R8.6.11 | 陰性   |
| 18193 | 土岐市泉町地内    | R8.6.8  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.11 | 陰性   |
| 18194 | 岐阜市岩井地内    | R8.6.5  | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.6.11 | 陰性   |
| 18195 | 岐阜市長良志段見地内 | R8.6.7  | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.6.11 | 陰性   |
| 18196 | 本巣市山口地内    | R8.6.8  | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.6.11 | 陰性   |
| 18197 | 高山市越後町地内   | R8.6.8  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.6.11 | 陰性   |
| 18198 | 恵那市串原地内    | R8.6.8  | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.6.11 | 陰性   |
| 18199 | 恵那市山岡町地内   | R8.6.9  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.6.12 | 陰性   |
| 18200 | 郡上市白鳥町地内   | R8.6.9  | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.6.12 | 陰性   |
| 18201 | 本巣市根尾能郷地内  | R8.6.9  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.12 | 陰性   |
| 18202 | 白川町切井地内    | R8.6.5  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.6.12 | 陰性   |
| 18203 | 本巣市根尾高尾地内  | R8.6.10 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.12 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所     | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18204 | 中津川市蛭川地内    | R8.6.10 | 捕獲 | 雄  | 約 103 cm | R8.6.12 | 陰性   |
| 18205 | 中津川市加子母地内   | R8.6.9  | 捕獲 | 雌  | 約 70 cm  | R8.6.12 | 陰性   |
| 18206 | 八百津町上飯田地内   | R8.6.9  | 捕獲 | 雌  | 約 94 cm  | R8.6.12 | 陰性   |
| 18207 | 岐阜市達目洞地内    | R8.6.10 | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18208 | 本巣市木知原地内    | R8.6.11 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.16 | 陰性   |
| 18209 | 土岐市泉町地内     | R8.6.11 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.16 | 陰性   |
| 18210 | 土岐市土岐津町地内   | R8.6.11 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18211 | 恵那市明智町地内    | R8.6.10 | 捕獲 | 雄  | 約 92 cm  | R8.6.16 | 陰性   |
| 18212 | 恵那市山岡町地内    | R8.6.11 | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18213 | 八百津町久田見地内   | R8.6.12 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18214 | 土岐市曾木町地内    | R8.6.12 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18215 | 可児市柿下地内     | R8.6.12 | 捕獲 | 雄  | 約 49 cm  | R8.6.16 | 陰性   |
| 18216 | 中津川市川上地内    | R8.6.12 | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.6.17 | 陰性   |
| 18217 | 郡上市美並町地内    | R8.6.12 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18218 | 美濃加茂市山之上町地内 | R8.6.12 | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.6.16 | 陰性   |
| 18219 | 美濃加茂市三和町地内  | R8.6.11 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18220 | 恵那市山岡町地内    | R8.6.12 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18221 | 可児市久々利地内    | R8.6.13 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18222 | 可児市久々利地内    | R8.6.13 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.6.16 | 陰性   |
| 18223 | 恵那市上矢作町地内   | R8.6.14 | 捕獲 | 雄  | 約 91 cm  | R8.6.18 | 陰性   |
| 18224 | 恵那市明智町地内    | R8.6.15 | 捕獲 | 雄  | 約 50 cm  | R8.6.18 | 陰性   |
| 18225 | 可児市久々利地内    | R8.6.15 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18226 | 可児市久々利地内    | R8.6.15 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.6.18 | 陰性   |
| 18227 | 可児市久々利地内    | R8.6.15 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18228 | 郡上市大和町地内    | R8.6.14 | 捕獲 | 雄  | 約 119 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18229 | 岐阜市岩井地内     | R8.6.13 | 捕獲 | 雌  | 約 93 cm  | R8.6.18 | 陰性   |
| 18230 | 岐阜市達目洞地内    | R8.6.14 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18231 | 白川町切井地内     | R8.6.12 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18232 | 美濃加茂市伊深町地内  | R8.6.15 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18233 | 美濃加茂市三和町地内  | R8.6.14 | 捕獲 | 雄  | 約 125 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18234 | 瑞浪市日吉町地内    | R8.6.15 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18235 | 坂祝町勝山地内     | R8.6.15 | 捕獲 | 雄  | 約 46 cm  | R8.6.18 | 陰性   |
| 18236 | 恵那市串原地内     | R8.6.13 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.18 | 陰性   |
| 18237 | 岐阜市岩井地内     | R8.6.14 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.6.18 | 陰性   |