

麻しんを持ち込まない・広めない (はしか) ために

帰国後
発症に気づかず出勤

職場内で感染が拡大

感染力が強い
(インフルエンザの約10倍!)

▼
免疫のない人は
ほぼ100%発症

1人の感染者から
職場閉鎖など…

▼
事業継続に重大な影響
を及ぼすリスク

ワクチン接種を検討しましょう

特に
20代～50代
の方は確認
ください▶

- ☐ 麻しんワクチンを2回接種していない
- ☐ ワクチン接種歴が分からない
- ☐ 麻しんにかかったことがない、分からない



ワクチン接種回数が少なく、
免疫力が低下している可能性
があります。

受診方法や予約等について、
また、妊娠出産年齢の女性は
医療機関にご相談ください。

ワクチン接種歴は母子手帳で
確認しましょう。

※接種回数が少なくても、一度感染して
発症すると、一生免疫が持続すると
言われています。



◆麻しんの特徴

- ・感染約10日後に発症
- ・発熱や咳、鼻水などの風邪症状が2～3日続いた後、**高熱と発疹**が出現

◆麻しんを疑う症状がある場合

- ・外出しない
- ・「麻しんかもしれない」と**事前に医療機関へ連絡**し、指示に従い受診する
- ・公共交通機関は利用しない

職場にあなたから

岐阜県

麻しんを持ち込まない・広めない （はしか）のために

帰国後
発症に気づかず出勤

職場内で感染が拡大

感染力が強い
(インフルエンザの約10倍!)

免疫のない人は
ほぼ100%発症

1人の感染者から
職場閉鎖など…

事業継続に重大な影響
を及ぼすリスク

ワクチン接種を検討しましょう

特に
20代～50代
の方は確認
ください▶

- ☐ 麻しんワクチンを2回接種していない
- ☐ ワクチン接種歴が分からない
- ☐ 麻しんにかかったことがない、分からない



ワクチン接種回数が少なく、
免疫力が低下している可能性
があります。

受診方法や予約等について、
また、妊娠出産年齢の女性は
医療機関にご相談ください。

ワクチン接種歴は母子手帳で
確認しましょう。

※接種回数が少なくても、一度感染して
発症すると、一生免疫が持続すると
言われています。



◆麻しんの特徴

- ・感染約10日後に発症
- ・発熱や咳、鼻水などの風邪症状が2～3日続いた後、**高熱と発疹**が出現

◆麻しんを疑う症状がある場合

- ・外出しない
- ・「麻しんかもしれない」と**事前に医療機関へ連絡**し、指示に従い受診する
- ・公共交通機関は利用しない