

～農作物の「台風」に対する指導要点～


令和8年8月3日 農業経営課

今年は6月に発生し、上陸した台風6号が記憶に新しいところであるが、7月までに13個の台風が発生しており、ハイペースでの発生となっている。

今後も十分な注意が必要と考えられ、熱帯低気圧の発生や発達等を随時、確認し、台風の大きさや進路に細心の注意を払い、事前・事後の対策により台風被害を最小限とするように農業者や関係機関に対して適切な指導を依頼する。

気象情報

1. これまでの気象経過



2. 今後の気象予測

東海地方1カ月予報 8月1日～8月31日までの天候見通し

名古屋地方気象台 7月30日発表

向こう1カ月の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高いでしょう。

期間の前半は、気温がかなり高くなる可能性があります。

◎1カ月の平均気温・降水量

平均気温	降水量
高い見込み	ほぼ平年並の見込み

◎週別の平均気温と天候

平均気温 (1週目)	平均気温 (2週目)	平均気温 (3～4週目)
8/1～8/7	8/8～8/14	8/15～8/28
高い見込み	高い見込み	高い見込み

※参考ホームページ

気象庁

過去の気象データ検索

<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

農業気象

<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/nougyou/nougyou.html>

向こう2週間・1カ月の予測

<https://www.data.jma.go.jp/risk/probability/index.html>

農作業安全

人命第一の観点から、ほ場の見回り等については気象情報を十分に確認し、大雨や強風が治まるまでは行わない。また、大雨が治まった後の見回りにおいても、増水した水路、その他の危険な場所には近づかず、ほ場周辺の安全に十分注意し、転落・滑落事故に遭わないよう慎重に行う。

また、台風通過後に事後対策を講じる場合には熱中症に注意し、高温下での長時間作業は避け、こまめな水分や塩分の補給と休息を取るよう心掛ける。特に、高齢者は喉の渇きや暑さを感じにくく、気付かないうちに熱中症になる可能性があるため、できるだけ単独での作業を避けるようにする。

病虫害対策

県病虫害防除所から発表される発生予察情報に基づき、適期防除に努める。農薬の使用にあたっては、登録内容を農林水産省の農薬登録情報提供システムで事前に必ず確認する。

1 病害の発生動向

(1) 水稻、大豆、野菜、花きへの被害

- ・風速 6 m/s 以上の強い風は植物体を揺さぶる事で茎や葉に傷をつくり、罹病しやすくする。
- ・夏秋トマトの疫病や細菌病のように降雨を伴った強風によって病原菌が伝搬し発生する事が多い。

(2) 果樹、茶への被害

- ・樹木においても、強風により細根切断を起こし地上部や地下部に病原体の侵入口を多くつくる。
- ・果樹の胴枯病は降雨に強風が重なると多発する。

2 虫害の発生動向

(1) 各作物への被害

- ・強風により被覆資材が損傷した場合、損傷箇所から害虫が侵入する。
- ・風により飛ばされた害虫が突発的に発生する場合もある。

作物ごとの対策については、以下のとおりである。

水 稲

農業技術センター（岐阜市）、中山間農業研究所本所（飛騨市）、中山間農業研究所中津川支所（中津川市）における生育調査結果を下表に示す。今年度は、6月中旬以降に高温で経過しているため、平坦地の早生品種を中心に生育が進んでいる。今後も高温で推移すると予想されるため、水管理や追肥、病虫害防除を適期に実施できるよう留意する。

表1 水稻の生育状況（岐阜県農業技術センター調 令和8年7月15日時点）

品種	田植時期	生育ステージ	項目	生育概況		
				令和8年	平年 (過去5年の平均)	前年
あきたこまち	5月11日	出穂期	草丈 (cm)	82.4	76.9	83.6
			茎数 (本/㎡)	325	319	311
			葉色 (GM値)	38.4	42.3	36.5
			葉令	13.0	12.5	12.2
コシヒカリ	5月11日	穂ばらみ期	草丈 (cm)	85.7	81.2	90.7
			茎数 (本/㎡)	323	339	383
			葉色 (GM値)	38.5	38.1	35.4
			葉令	12.3	12.4	12.0

にじのきらめき	5月11日	穂ばらみ期	草丈 (cm) 茎数 (本/m ²) GM値 葉令	81.9 318 38.1 12.8	— — — —	— — — —
清流のめぐみ	5月11日	穂ばらみ期	草丈 (cm) 茎数 (本/m ²) GM値 葉令	92.1 272 36.3 13.3	— — — —	— — — —
ハツシモ岐阜SL	5月11日	幼穂形成期	草丈 (cm) 茎数 (本/m ²) 葉色 (GM値) 葉令	72.1 372 34.5 13.3	70.9 359 37.3 12.7	70.7 487 33.6 12.5
ほしじるし	6月10日	分けつ盛期	草丈 (cm) 茎数 (本/m ²) 葉色 (GM値) 葉令	48.2 276 36.1 8.8	51.3 347 40.1 9.7	45.2 355 36.8 8.8
ハツシモ岐阜SL	6月10日	分けつ盛期	草丈 (cm) 茎数 (本/m ²) 葉色 (GM値) 葉令	42.5 276 38.1 8.9	46.8 315 40.5 9.8	39.2 264 39.8 9.0

表2 水稻の生育状況（岐阜県中山間農業研究所本所調 令和8年7月15日時点）

品種	田植時期	生育ステージ	項目	生育概況		
				令和8年	平年 (過去5年の平均)	前年
あきたこまち	5月15日	穂ばらみ期	草丈 (cm) 茎数 (本/m ²) 葉色 (GM値) 葉令	72.9 467 45.7 11.9	75.1 490 43.5 11.9	82.5 451 43.9 11.1
ひとめぼれ	5月15日	幼穂形成期～ 穂ばらみ期	草丈 (cm) 茎数 (本/m ²) 葉色 (GM値) 葉令	69.7 496 40.4 11.6	73.9 552 42.1 11.7	81.3 491 41.4 11.3
コシヒカリ	5月15日	幼穂形成期～ 穂ばらみ期	草丈 (cm) 茎数 (本/m ²) 葉色 (GM値) 葉令	76.4 527 37.4 11.7	79.1 523 42.1 11.6	80.2 488 41.7 11.4
清流のめぐみ	5月15日	幼穂形成期～ 穂ばらみ期	草丈 (cm) 茎数 (本/m ²) GM値 葉令	82.9 389 38.6 11.7	— — — —	— — — —
たかやまもち	5月15日	穂ばらみ期	草丈 (cm) 茎数 (本/m ²) 葉色 (GM値) 葉令	71.9 487 43.4 11.8	75.2 487 42.9 11.9	80.4 468 44.0 11.9
ひだほまれ	5月15日	幼穂形成期～ 穂ばらみ期	草丈 (cm) 茎数 (本/m ²) 葉色 (GM値) 葉令	76.6 300 41.4 11.9	80.3 359 42.7 12.1	82.3 273 42.1 11.9

表3 水稻の生育状況（岐阜県中山間農業研究所中津川支所調 令和8年7月15日時点）

品種	田植時期	生育ステージ	項目	生育概況		
				令和8年	平年 (過去5年の平均)	前年
あきたこまち	5月15日	幼穂形成期	草丈 (cm)	72.5	71.0	86.4
			茎数 (本/㎡)	464	382	379
			葉色 (GM値)	35.3	34.7	36.3
			葉令	11.2	11.4	12.6
ひとめぼれ	5月15日	幼穂形成期	草丈 (cm)	70.1	72.2	80.0
			茎数 (本/㎡)	569	454	468
			葉色 (GM値)	32.7	33.1	32.1
			葉令	10.9	11.0	11.7
コシヒカリ	5月15日	幼穂形成期	草丈 (cm)	75.2	79.4	93.9
			茎数 (本/㎡)	523	449	490
			葉色 (GM値)	32.1	31.0	30.9
			葉令	10.8	11.0	11.5
清流のめぐみ	5月15日	幼穂形成期	草丈 (cm)	72.7	—	—
			茎数 (本/㎡)	432	—	—
			葉色 (GM値)	29.7	—	—
			葉令	12.6	—	—
にじのきらめき	5月15日	幼穂形成期	草丈 (cm)	64.4	—	—
			茎数 (本/㎡)	420	—	—
			葉色 (GM値)	31.8	—	—
			葉令	11.5	—	—
ココノエモチ	5月15日	幼穂形成期	草丈 (cm)	67.1	66.9	80.3
			茎数 (本/㎡)	499	410	440
			葉色 (GM値)	32.9	30.9	30.0
			葉令	10.9	11.3	11.7
酔むすび	5月15日	幼穂形成期	草丈 (cm)	75.1	—	—
			茎数 (本/㎡)	520	—	—
			GM値	31.1	—	—
			葉令	12.4	—	—

水稻への風害は風速 10m/s を超える頃から増え始めるが、風速や水稻の生育ステージなどにより被害は異なる。また、台風通過後のフェーン現象により高温で乾燥した風が吹く事で被害をもたらす場合もある。特に、

水稻の乳熟期から糊熟期には穂ズレによる籾の変色や着色粒・奇形粒を多発させ、黄熟期には穂が重くなるため倒伏しやすくなり、登熟不良とともに品質低下を招く。

水害は穂発芽を引き起こす。穂発芽性は品種により異なるが、倒伏して稲穂が水に浸かると穂発芽が進行する。

また、山間部では水田への土砂流入・埋没あるいは水田の流亡などの大被害が発生する事がある。気象予報を確認して事前に対策を実施すると共に、くれぐれも身の安全を確保する行動をとる。

1 排水対策と水管理

(1) 水田及び水路の事前整備

- ・浸水の恐れのある低地・排水不良地では、排水ポンプの確保と整備をしておく。
- ・排水路からの逆流水害を防ぐため、水路の補修・ゴミ等の除去を行っておく。
- ・降雨時に自然落水しないよう、排水口や畦の点検・補修をしておく。

(2) 水管理

- ・表土の流亡を防ぐと共に、急激な蒸散による水分ストレスを回避するため入水しておく。
- ・水位は深水とし、風による稲株の揺れを少なくし、葉の損傷・穂ズレを軽減させる。

- ・台風通過後の晴天と吹き返しにより蒸散が激しくなるので、倒伏しなかった水田では数日間、湛水状態を保つ。
- ・逆に、冠水した場合は葉先が少しでも水面から出ていれば被害が軽くなるため、可能な限り早い排水に努める。

2 その他の栽培管理

(1) 倒伏への対策

- ・可能であれば、倒伏した稲株は稈や葉の挫折・損傷に注意しながら起こす。

(2) 病虫害防除

- ・台風通過後は白葉枯病、穂いもち、ウンカ類が発生しやすいので、発生状況に注意し、状況によっては早めに防除する。

(3) 早期収穫

- ・収穫時期に達した水田はもちろん、帯緑籾率 15%に達した水田では、可能な限り収穫作業を進める。

大豆

大豆は他の作物に比べて湿害や冠水害に弱い作物である。開花期以降には多量の水を必要とするが、登熟中期に 5 日間の冠水で全て枯死、黄熟期以降では 1 日の冠水で 30%が屑粒に、4 日の冠水で 80%が屑粒になった事例もあるので、ほ場への浸水に注意する。

また、強風では葉の損傷・茎折れ・倒伏が発生し、莢数の減少や不完全粒・不稔莢の増加が起こり、台風通過後には損傷を受けた部分から病害も発生しやすい。

1 排水対策

- ・排水溝などの点検を行うと共に排水口・排水路の保守点検を行う。
- ・低地や排水不良地では、排水ポンプの確保と整備をしておく。
- ・万が一、冠水や滞水したほ場では一刻も早い排水に努める。

2 病虫害防除

- ・生育遅れや根腐れを引き起こし、病虫害への抵抗性が弱まる事や、損傷部からの病原菌の侵入により病害の発生が懸念される事などから、病虫害の発生動向に注意し適切に防除を行う。

野菜

野菜の台風被害は、強風による施設や野菜の損傷、降雨による冠水や湿害などが挙げられる。風水害対策を徹底すると共に台風通過後の病虫害発生状況を確認し必要に応じて、防除を行う。

1 風 害

強風による野菜の被害には、野菜への直接被害と施設栽培における施設被害がある。施設被害は、施設の強度によって様々であるが、地形や台風のコースによっても風力が異なるため、気象情報、過去の風力、風向きなどを十分考慮に入れて対策を立てる。

(1) 強風対策

常に新しい気象情報の入手に留意し、施設の補強に努めておく。

① 施設の事前・事後対策

- ・施設では筋交い・支柱、横張り等による補強に努めると共に、施設を密閉しフィルムの破損、はがれに注意して風を施設内に入れないようにする。
- ・フィルムが緩んでいると強風にあおられ被害を生じやすいので妻面の補強、マイカー線、ラセン杭等の点検を行う。通過後、ビニールが剥がれた場合は速やかに被覆する。
- ・強風 (20m/s 以上) が予想される場合、パイプハウス等ではビニールの除去も考える。

- ・万が一、施設に被害が出た場合は地区の生産組合員と協力して施設の応急補修を行う。
台風通過後の野菜は品薄状況となりやすいので、できる限り出荷しつつ、施設の応急修理と作物の回復処理をする。

② 栽培管理における事前・事後対策

- ・露地野菜やいちごの育苗床等、比較的背の低い作物や横に伏せても生育に極端な影響を及ぼさない野菜については、苗を横に寝せて寒冷紗や不織布等でゆるみのないようにべたがけをして、風雨の過ぎるのを待つ。
- ・べたがけ被覆資材の除去は台風通過後の状況により、速やかに除去するか、しばらく被覆を続行するかを判断する（晴天で強風が続く場合等）。
- ・事前に液肥等葉面散布資材の確保を行っておき、台風通過後は出来るだけ早く葉面散布を実施し、草勢回復に努める。
- ・軟腐病菌はナス科、アブラナ科、キク科、ユリ科、セリ科等多犯性であり、台風や豪雨により問題となるので、台風通過後は銅剤などで防除を行う
- ・回復見込みのない野菜は、まき直しをするか他の野菜に転作する。

2 湿害・冠水害対策

水害は浸水・冠水の時間及び水温等によって被害程度が異なる。また、野菜の種類によって被害に対する強度は異なるが、水田輪換畑では危険度が高い。

一般に気相率が10%以下になると、根の呼吸に必要な酸素が不足し、根腐れの原因となる。また、地温や水温が高いほど、土壌中の溶存酸素量が減少する。

下記の表4は野菜の種類別冠水抵抗性であるが、冠水でも流れている真水では、滞水している濁水に比べ、いちご等では2倍以上の抵抗性がある場合もある。

また、野菜においては、風による機械的な損傷に加え、豪雨による叩き付けや、そこから侵入する病害、湿害等二次的障害による被害の拡大も考慮する。

表4 野菜の種類別冠水抵抗性〔渡辺ら（1948）〕

冠 水 程 度	作 物 名
数時間で障害を受けるもの	だいこん、はくさい、なす、えだまめ
1 日間 "	さつまいも、にんじん、ごぼう
数日間でも殆ど影響のないもの	さといも

(1) 排水対策

冠水や湿害に弱い野菜が多いので事前及び事後の排水対策を徹底する。

①は場及び排水路の整備と事後対策

- ・低湿で浸水が常発する地域では、二段排水、排水溝・排水路の整備、高畝栽培、高畦、高設ベンチ、遮水壁の設置など十分な排水対策をしておく。
- ・排水ポンプの確保と整備をしておく。
- ・排水路の確認と広域排水路の障害物除去、ポンプによる強制排水により地表水を速やかに排除するとともに、遮水壁（ビニール等）により雨水の浸入を防止する。
- ・冠水状態で強制排水が難しい場合は、滞水させることなく、新しい流水が確保できるよう、地域状況を把握し最良の方法を実行する。
- ・養液栽培等で源水が懸濁した場合は、速やかな復旧を図る。

②栽培管理における事前・事後対策

- ・豪雨による傷害や泥の跳ね上げ、土の流亡を防ぎ、土壌水分の安定を図るため敷きワラ、敷き草を行う。
- ・排水が終わり次第、農薬登録のある薬剤（登録状況は農薬登録情報提供システムで必ず確認する）などで、予防散布を行う。
- ・根が洗い出された場合は速やかに土寄せを行うとともに、地中に酸素を補給するため土壌の乾き具合を見て軽い中耕を行う。

- ・根菜は地下部を、果菜は生長点や花芽を良く観察し、回復の見込みの無い場合はまき直しや作目変更を考える。
- ・肥料が流亡している場合は、生育の回復の兆しが見えたら500～600倍の液肥を施し、速やかな草勢回復に努める。
- ・栽培施設の破損がある場合はただちに補修する。ビニールや防虫ネットの破損を放置しておく、害虫が侵入し2次被害につながるため、早めに補修を行いつつ農薬散布で侵入した害虫を防除する。
- ・ハウスサイドを被覆している場合は、すぐに開けて通風し、蒸れの防止を図る。

3 品目別対策

(1) トマト

- ・風による傷口からの病原菌の侵入を防ぐため、風がおさまってからすぐに殺菌剤を散布する。
- ・特に、風に揉まれた場合は、マンゼブ・メタラキシルM水和剤などで防除する（登録状況は農薬登録情報提供システムで必ず確認する）。
- ・草勢の低下は灰色かび病、葉かび病等の病害発生につながるため、施肥、灌水管理により草勢回復を図る。

(2) ほうれんそう

- ・収穫期に達しているものについては収穫を急ぐ。
- ・回復が見込める場合は殺菌剤による防除を行う。
- ・風水害による被害を受けた場合には、出荷することが可能か判断を行い、出荷できない場合は速やかにまき直しを行う。

(3) なす、ピーマン

- ・台風などで浸水・冠水すると、青枯病や疫病等の発生が多くなる。ほ場の排水に努めると共に、台風通過後は農薬による防除を徹底する。
- ・強風で枝が折れたり葉が傷んだりした場合は、早めに除去して、新たに発生した側枝を利用する。
- ・草勢回復のために薄めの葉面散布等を実施する。

(4) いちご

- ・育苗中の苗に台風による浸水・冠水があると炭疽病、疫病が増加するため、冠水しないよう排水を良くする。
- ・強風対策で育苗用雨よけビニールを除去し、苗が直接強い風雨にさらされた場合も、病害等が発生しやすくなる。そのため、通過後は直ちに防除を行うとともに、その後も定期的な防除を継続する。

(5) えだまめ

- ・多雨後の高温下では数時間の湛水により根への障害が発生しやすくなるため、早めの排水に努める。
- ・風雨による茎葉の傷口から細菌が侵入することにより細菌性の病害が発生しやすくなるため、台風通過直後の銅剤散布や茎疫病等への防除対策を実施する。
- ・播種直後の冠水では、極端な発芽不良が生じる場合があるため、状況に応じて再播種も検討する。

(6) あぶらな科野菜

- ・多雨等により軟腐病、黒腐病、黒斑細菌病等の細菌性病害が多発することがあるので注意する。
- ・風雨による傷口は侵入感染を容易にする。初発生した後の曇雨天は激発を招くため、細菌性病害に効果の高い薬剤散布を行う。
- ・定植時期と台風が重なる場合は、早めに畝を作っておく。土が締まった場合は、活着後ただちに中耕を行う。

(7) アスパラガス

- ・強い風雨にさらされた場合は、茎枯病の発生と蔓延の恐れがあるため、直ちに防除を行う。
- ・茎葉が傷んだ場合は細めの茎を選んで立茎させ、茎葉の確保に努める。
- ・液肥による追肥を行い、草勢維持に努める。

花 き

花きの台風被害も野菜と同様に、強風による施設や花きの損傷、降雨による冠水や湿害などが挙げられる。風水害対策を徹底すると共に台風通過後の病虫害発生状況を確認し必要に応じて、防除を行う。

1 風 害

強風による花きの被害は、花きへの直接被害と施設栽培における施設被害がある。施設被害は、施設の強度によって様々であるが、地形や台風のコースによっても風力が異なるため、気象情報、過去の風力、風向きなどを十分考慮に入れて対策を立てる。

(1) 風害対策

常に新しい気象情報の入手に留意し、施設の補強に努めておく。

①施設の事前・事後対策

- ・施設では筋交い・支柱、横張り等による補強に努めると共に、施設を密閉しフィルムの破損、はがれに注意して風を施設内に入れないようにする。
- ・フィルムが緩んでいると強風にあおられ被害を生じやすいので妻面の補強、マイカー線、ラセン杭等の点検を行う。通過後、ビニールが剥がれた場合は速やかに被覆する。
- ・強風（20m/s 以上）が予想される場合、パイプハウス等ではビニールの除去も考える。

②栽培管理における事前・事後対策

- ・ほ場周辺に飛散するものが無いよう、整備・整理しておく。
- ・露地ギク等では倒伏の恐れがあるため、フラワーネットや支柱などで補強する。倒伏した場合は、支柱を利用して出来る限り早めに起こし、曲がりを回避する。
- ・強風による傷口からの病原菌の侵入を防ぐため、台風通過後速やかに防除を行う。

2 湿害・冠水害対策

花きは湿害や冠水に弱いので事前及び事後の排水対策を徹底する。

(1) 排水対策

①ほ場及び排水路の整備と事後対策

- ・ほ場が過湿になると根傷みが発生するため、排水路の整備などにより排水対策を行う。
- ・冠水は土中の酸素不足を引き起こし、根腐れを生じさせると共に土壌病害の発生原因となるため、速やかな排水に努める。
- ・施設栽培では、高温多湿により灰色かび病等が発生し易くなるため、循環扇等を利用した栽培環境対策を行う。
- ・養液栽培では水源が汚染されると根部病害が発生し、甚大な被害が発生するので、水源が汚染されないよう注意する。

②栽培管理における事後対策

- ・台風通過後出来るだけ早く、液肥等の葉面散布を行い草勢回復に努める。

果 樹

県内の主要果樹は果実肥大期（7月現在）で、いずれの樹種も平年、昨年を上回る肥大状況となっている。美濃平坦地のナシ、飛騨地域のモモは早生品種で既に収穫が始まっており、平年より早い収穫開始となっている。高温期での収穫となることから、収穫適期に注意し（遅れない）、収穫時の果実の取扱い、品質管理に留意して作業を行う。また、台風シーズンに入るため、事前・事後の対策を徹底する。

表5-主要果樹の果実肥大

樹種	品種	7月下旬	前年比 (%)	平年比 (%)
カキ	富有	果周：21.6cm	103%	107%
ナシ	幸水	果周：28.6cm	116%	112%
モモ	白鳳	縦径：71.7cm 側径：74.4cm	縦径：115% 側径：117%	縦径：110% 側径：111%
リンゴ	ふじ	縦径：57.0cm 側径：62.5cm	縦径：115% 側径：113%	縦径：109% 側径：109%

※カキ、ナシ：農業技術センター 7/25 時点、モモ、リンゴ：中山間農業研究所 7/20 時点

果樹の台風の被害は、強風による物理的な損傷であり、果実では傷や擦れ、落果、樹体では葉の損傷、落葉、枝折れ、樹体の倒伏等である。果実の落果被害は果重に比例し、枝の長さの二乗に比例すると言われており、ナシ、リンゴ、クリ等で被害が多い。カキは果重が大きい果梗が強く、比較的落果は少ない。

1 恒久的対策

(1) 防風施設の設置と樹種・品種の組合せ

- 直接的に風圧を弱め被害軽減を図ることを目的に、防風ネット等を導入する。
- 台風の襲来は7～10月に及ぶが、特に8～9月が多いため、樹種・品種の組み合わせにより、収穫期をずらし、危険分散を図る。

2 事前事後の対策

(1) 事前対策

- 多雨により冠水、滞水の恐れがある場合は、排水溝の確認など事前の排水対策を徹底する。
- 落葉果樹では、倒伏防止や主枝・亜主枝等太い枝が折れないよう支柱で固定する。発生角度のせまい枝は被害を受けやすいので、針金等を利用し結束しておくといよい。
- なし・ぶどう等の棚栽培は、強風によりあおられやすいので、事前に張線の締め直しや支柱やアンカーを増やし補強しておく。園の周囲を防風ネット等で囲う場合は、強風により非常に大きな力を受けるので、十分な補強をしておく。
- わい化りんごでは、根が浅く倒伏しやすいので、棚や支柱の点検・補強を行い、張線への結束の確認をしておく。
- 収穫時期を迎えている場合、落果被害が想定される時は事前収穫を行うことも検討する。

(2) 事後対策

- 滞水した場合、外的変化が現れてからは手遅れになるので、できるだけ早くほ場の排水対策に努める。
- 倒伏した樹は、根を傷めないよう丁寧に樹を起こし、株元に土を寄せて踏み固め、支柱を添えて固定する。
- 太い枝の裂けは、回復見込みのある場合は元の状態に枝を起こし、支柱を添えて結束し補強する。回復見込みのない場合は枝を切り戻し、切り口に塗布剤を塗布する。
- 落果果実は、病害の感染源となるため、速やかに園外で処分するか、土中に埋める。
- 強風、降雨、土の跳ね上がり果実や樹体の損傷等により、病害の発生が懸念されるため、防除基準に基づき、速やかに薬剤防除を徹底する。
- 落葉がひどい場合は、被害程度や樹勢に応じて摘果を行い、樹体への負担を軽減する。また、追肥量は控え、枝の徒長や二次伸長の発生を防ぐ。
- 有袋栽培で果実袋の破れや汚れが見られる場合は、新しい果実袋でかけ直す。

茶

1 事前事後の対策

(1) 事前対策

- ・多雨により冠水、滞水の恐れがある場合は排水溝の確認など事前の排水対策を徹底する
- ・摘採期を迎えている場合には、可能な限り、台風が近づく前に摘採を行う。

(2) 事後対策

- ・ほ場が滞水した場合は、生育不良等を起こしやすいので、できるだけ早くほ場の排水対策に努め、長時間の冠水又は浸水を避ける。
- ・過湿や強風により病害の発生が助長されるので、殺菌剤を散布し病害の発生を防止する。とくに炭そ病は、台風によって病原菌の飛散が拡大すると、その後の天候によっては激発するので注意が必要である。
- ・幼木園において、強風により樹がゆすられた場合は、早めの土寄せや敷き草を行い地際部や根を保護する。
- ・台風通過後は、茶工場、防霜ファン、棚施設、茶園の排水溝や法面等を点検し、必要に応じて修復を行う。

飼料作物

飼料作物の台風被害は、トウモロコシなど背の高い作物では強風による倒伏、転換畑では降雨による湿害や機械作業性の悪化が挙げられる。

1 事前対策

(1) 管理、調整等作業

- ・背の高い作物は倒伏すると減収し品質も低下するため、倒伏した場合は早めに収穫して良質なサイレージ調製に努める。
- ・倒伏し泥や土が作物に付着している場合、サイレージ調整時に不良発酵やカビの発生につながるため、高刈りや収穫しない等の対応に努める。
- ・飼料作物については、天候に応じて迅速に管理・収穫作業等が行えるよう作業の体制を十分整えておくとともに、調整法についても、例えば乾草からサイレージに切り替える等臨機応変な対応が取れるよう努めること。

(2) 排水路の整備

- ・転換畑では排水溝を点検し、速やかに排水できるよう対策を講じる。

2 事後対策

(1) 管理、調整等作業

- ・冠水や浸水等の被害を受けた圃場においては、速やかな排水に努めること。
- ・収穫適期が近づいているものは、収穫を急ぐ。
- ・収穫期にある飼料作物は、天候の回復後に収穫を行うよう努めること。また、とうもろこし等の長大作物が倒伏した場合は、品質低下を防ぐため、天候の回復後、速やかに収穫を行うよう努めること。

畜 舎

畜舎や堆肥舎に雨水が流入すると畜舎や周辺の環境を悪化させる。また、山間部では冠水や道路の寸断などにより、飼料や燃料の供給が滞ることも想定される。また、台風通過後の急激な暑さは家畜の健康を害する恐れもあるので温度管理に注意する。

1 事前対策

(1) 畜舎及び機械の点検整備

- ・突風やこれに伴う損傷、倒壊に備えて、畜舎の扉・窓の点検補修を行うとともに、大雨による畜舎内への浸水のおそれがある場合は、これに加えて明きょの施工等により十分な排水に努めること。
- ・畜産関係車両の搬入路の亀裂なども点検しておき、万が一通常の搬入路が使えない時の対応を考えておく。
- ・停電に備えて、必要な非常用発電機等の調達・試運転をしておき、搾乳作業やバルククーラーの冷却や畜舎内の照明・換気・空調等に支障のないよう万全を期す。
- ・汚水処理施設は大雨により水位の上昇が起こるので、早めに排水を行い、水位を一定に保つよう努める。
- ・大雨による堆肥舎への浸水は堆肥の水分量増加や汚水の流出に繋がるため、浸水の防止や堆肥の搬出等の対策実施に努める。

(2) 家畜の飼養管理等

- ・飼料は倉庫や畜舎に入れ、雨水がかからないようにする。
- ・山間部においては、畜産関係車両が通行できない場合に備え、飼料や燃料は余裕をもって1週間以上の在庫を確保できるよう計画的な生産や購入に努め、その保管場所については河川の増水や土砂崩れのリスクも考慮し、分散して保管するなどの工夫をすること。
- ・飲水については貯留タンクの設置や汲み上げポンプを準備するなどの対応を行うよう努めること。

2 事後対策

(1) 畜舎等への対応

- ・台風通過後、周辺の安全を確認後速やかに畜舎や飼料倉庫等の被害状況を確認すること。
- ・停電が復旧したら換気扇や照明などを正常に作動させ、家畜の快適な環境を確保すること。
- ・機械への通電を再開する際には、漏電やショートに十分注意すること。
- ・台風通過後は、急激に気温が上昇する場合があるので畜舎内の換気に努める。
- ・踏み込み消毒槽は雨水や泥が混入すると殺菌効果が弱くなるため、交換頻度を増やす。
- ・畜舎への浸水があった場合、畜舎内及びその周辺の排水状況を確認し、対応すること。
- ・土砂が流入した場合には、再度の土砂流入等の事故に十分注意しつつ土砂の除去に努めること。
- ・畜舎、牧柵、防鳥ネット等の施設に破損、汚染がないかを確認し、状況に応じて補修、洗浄、消毒を行うよう努めること。

(2) 家畜の飼養管理等

- ・家畜の負傷や死亡がないかを確認すること。
- ・飲水に適した水の給与や家畜の健康観察など、家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準に沿った衛生管理を徹底し、家畜の伝染性疾患の発生予防措置を講じるよう努めること。
- ・保管している飼料が冠水等の被害を受けた場合、当該飼料の家畜への給与は中止すること。
倒伏の影響等により品質が低下した飼料を給与する場合にあっては、栄養価、嗜好性等にも配慮し、家畜の生産性が低下することの無いよう注意すること。

参考となる情報源

<農林水産省ホームページ>

気象庁が発表する気象情報等に基づき、農作物等の被害防止に向けた技術指導通知(農林水産省生産局、政策統括官及び地方農政局生産部等から発出)が掲載されている。

- 被害防止に向けた技術指導
http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/gijyutu_sido.html

<農薬情報>

現在、登録のある農薬の使用基準などを検索して、内容が確認できる。

- 農林水産省
 - ・ 農薬登録情報提供システム
<https://pesticide.maff.go.jp/>

<気象情報>

岐阜県における、現在の気象状況を確認できる。

- 気象庁（防災情報）
<https://www.jma.go.jp/jma/menu/menuflash.html>
- 岐阜地方気象台
<http://www.jma-net.go.jp/gifu/>
- デジタルアメダスアプリ（気象庁アプリ）
スマートフォンによりピンポイントで登録した地点の降水量や気温の解析値が表示される。
期間を設定して気温や降水量の積算を出すことも可能である。

<引用書籍>

- 「植物栄養土壌肥料大辞典」 養賢堂
- 「農産物等災害の手引き」 岐阜県