

## クビアカツヤカミキリによる被害

- クビアカツヤカミキリによる被害を受ける樹種 → **バラ科の樹木**  
サクラの仲間：**サクラ類**（ソメイヨシノほか栽培品種を含む。）、サクランボ（おうとう）  
モモの仲間：**モモ**（ハナモモを含む。）、ネクタリン  
スモモの仲間：スモモ、**ウメ**、アンズ
- 多くの幼虫に加害された木は **1年～数年で枯死**する。



クビアカツヤカミキリの被害を受けた桜並木  
（上：栃木県栃木市、下：栃木県足利市）



被害が悪化し枯死したスモモ



スモモの中に  
潜んでいた幼虫

（和歌山県かつらぎ町の被害園地）



スモモから排出されたフラス

# クビアカツヤカミキリ県内発生状況

## 調査重点地域

23市町

○成虫・幼虫・フラス確認地域  
(5市3町)

**赤色**：成虫または幼虫の確認地域  
海津市、各務原市、羽島市、  
池田町、岐阜市

**青色**：フラスの確認地域  
海津市、各務原市、羽島市、  
輪之内町、岐阜市、安八町、  
大垣市

○被害隣接地域 (5市10町)

**黄色**：被害隣接地域  
岐南町、笠松町、北方町、  
瑞穂市、本巣市、山県市、  
神戸町、養老町、関ヶ原町、  
垂井町、揖斐川町、大野町、  
関市、美濃市、坂祝町

