


年末年始・春節の時期です 鳥インフルエンザに最大の警戒を！！

昨年(H26-27)の同時期
野鳥・家きんでの発生状況
(高病原性鳥インフルエンザ)



～本年度の野鳥における低病原性鳥インフルエンザ確認状況～

県名	場所	確定	採材日
徳島県	鳴門市	H5N3亜型	2015.10.28
島根県	安来市	H5N3亜型	2015.11.1,11.20
宮崎県	宮崎市	H5N3亜型	2015.11.25
茨城県	鉾田市	H7N2亜型	2015.12.

平成27年12月24日現在

低病原性鳥インフルエンザ

対策はウイルスの鶏舎への
侵入防止に努めることです

<症状> * 無症状の場合もあります

- ・最もよくみられるのは、咳、くしゃみ、喘鳴、流涙など呼吸器症状
- ・産卵低下や被毛粗剛、沈鬱、元気衰退、食欲減退、下痢などもみられる。

これらの症状を認めた場合は
すぐに家畜保健衛生所へ連絡

★伝播力が強いものの、ほとんど臨床症状を示さず、発見が遅れるおそれがある
(海外では、高病原性鳥インフルエンザに変異した事例も確認されている)

飼養衛生管理基準を再確認・徹底 をお願いいたします



車両

…ウイルスが車両に付いてきているかも

- ・トラックの荷台は洗浄してから消毒していますか？
- ・運転席マット等、土が付着する場所は洗浄・消毒していますか？
- ・農場に出入りする際は消毒していますか？
- ・乗車前、降車後に手指の洗浄・消毒をしていますか？



簡易消毒機



消毒用動力噴霧器





農場の入口

…ウイルスが農場入口まできているかも

- ・消毒前の水洗で、長靴(靴底)の汚れを落としていますか？
- ・消毒液は汚れていませんか？
- ・消毒液の濃度は十分ですか？
- ・手指の洗浄・消毒はしていますか？
- ・手を拭くときのタオルを使い回していませんか？

防鳥ネットを設置しましょう



鶏舎、農場敷地周縁に2~3m幅で
消石灰を散布しましょう

消石灰の効果

1. 高病原性鳥インフルエンザに対する消毒効果
2. ネズミなどの野生動物に忌避効果あり



鶏舎

…ウイルスが農場に入っているかも

- ・専用の衣服・長靴を着用していますか？
- ・給水、給餌施設の野生動物対策は大丈夫ですか？



新鮮な水道水を使用しましょう



年末年始も異常を認めた場合は、すぐに家畜保健衛生所へ連絡してください

☎ 0574-25-3111

●閉庁時は案内に従い「1」番をプッシュしてくださいつながらない場合は 0574-25-3484
土日・祝日、閉庁時も通報を受け付けます